



CONCURSO PÚBLICO 2011

Universidade Federal de Santa Maria

Auxiliar de Saúde

Nome:

Inscrição:

UFSM

PRRH
Pró-Reitoria de Recursos Humanos

PROGRAD
UFSM

COPERVES
UFSM

01 Conceitua-se Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como

- (A) produtos usados na descontaminação do paciente.
- (B) equipamentos de uso geral na limpeza do ambiente hospitalar.
- (C) produtos ou dispositivos usados junto ao corpo do trabalhador e destinados à proteção contra riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais.
- (D) equipamentos utilizados na esterilização do paciente e na remoção da sujidade do ambiente.
- (E) equipamentos que servem para a proteção somente do paciente.

02 Quanto ao descarte do lixo perfurocortante, este deverá ser acondicionado em

- (A) qualquer recipiente, desde que seja encaminhado ao container externo.
- (B) recipiente específico para a coleta de resíduos perfurocortantes.
- (C) sacos plásticos duplos de cor preta.
- (D) lixeira comum, mas com identificação de contaminado.
- (E) hamper comum.

03 Considerando as técnicas de limpeza, relacione as colunas.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Limpeza Concorrente | () Processo de desinfecção de todas as áreas do hospital para reduzir a sujidade e a população microbiana. |
| 2. Limpeza Intermediária | () Processo de limpeza em locais de alta rotatividade, devendo ser realizada nos três períodos do dia. |
| 3. Limpeza Terminal | () Processo de limpeza de todas as áreas do hospital, objetivando a manutenção e a reposição dos materiais de consumo diário. |

A sequência correta é

- (A) 3 - 2 - 1.
- (B) 1 - 3 - 2.
- (C) 3 - 1 - 2.
- (D) 2 - 3 - 1.
- (E) 2 - 1 - 3.

04 Quanto à lavagem das mãos, essa higienização deve ser realizada

- I - sempre antes e após a ida ao banheiro.
- II - antes do início do turno de trabalho.
- III - antes e depois da realização de técnicas e/ou manuseio com o paciente.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas III.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05 Quanto às almotolias, está CORRETO afirmar que elas

- ☐ (A) são protetores auriculares.
- ☐ (B) servem para acondicionar antissépticos.
- ☐ (C) devem ser trocadas a cada 15 dias.
- ☐ (D) devem ser completadas quando o antisséptico chegar à metade.
- ☐ (E) não podem ser reprocessadas.

06 Indique verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre o uso do álcool.

- ☐ () Deve ser sempre utilizado na concentração de 100 %.
- ☐ () É utilizado para antissepsia de pele das mãos.
- ☐ () Possui efeito químico persistente.
- ☐ () É um dos mais seguros e efetivos antissépticos.
- ☐ () Seu efeito biológico de dano microbiano não permanece por várias horas.
- ☐ () É de ação rápida, de largo espectro e baixo custo.

A sequência correta é

- ☐ (A) V - V - V - F - V - F.
- ☐ (B) F - F - V - V - V - F.
- ☐ (C) V - F - F - V - F - V.
- ☐ (D) V - V - V - F - F - F.
- ☐ (E) F - V - F - V - F - V.

07 Quanto ao uso de luvas, é um procedimento CORRETO

- ☐ (A) reutilizá-las entre procedimentos e entre o contato com pacientes.
- ☐ (B) descartá-las somente no final do turno de trabalho.
- ☐ (C) permanecer com elas, inclusive no toque de objetos como maçanetas, telefone e outros.
- ☐ (D) retirá-las sem a necessidade de lavar as mãos.
- ☐ (E) removê-las sempre que em contato com material biológico potencialmente infectante.

08 Ao limpar a mesa de cabeceira do paciente, observa-se a presença de uma seringa com agulha desencapada com seu invólucro ao lado. Nessa situação, o auxiliar de saúde deve

- ☐ (A) reencapá-la e após fazer o descarte no recipiente coletor apropriado.
- ☐ (B) descartá-la no lixo infectante, não necessariamente no coletor apropriado.
- ☐ (C) reencapá-la, mantendo-a na cabeceira até chamar a enfermagem.
- ☐ (D) descartá-la diretamente no recipiente coletor apropriado.
- ☐ (E) reencapá-la e desprezá-la no lixo comum.

09 ANVISA é a sigla referente à

- (A) Agência Nacional de Vacinação em Saúde.
- (B) Associação Nacional de Vigilância Sanitária.
- (C) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (D) Agência de Natureza Vacinal de Saúde.
- (E) Associação Nacional de Vigilância em Saúde.

10 A limpeza de superfícies deve ser

- (A) feita no mínimo seis vezes ao dia.
- (B) realizada somente para retirar pó, com pano seco.
- (C) feita somente uma vez por dia.
- (D) realizada somente quando houver contaminação visível.
- (E) regular e periódica sempre ao término de um turno.

11 No Centro Cirúrgico, a limpeza deve ser realizada

- (A) antes, durante e depois de cada procedimento cirúrgico e ao final de cada dia.
- (B) depois de cada procedimento, usando somente álcool.
- (C) somente em superfícies com secreções e sujidade.
- (D) com varredura e remoção do pó.
- (E) durante o procedimento cirúrgico, sempre que necessário.

12 São procedimentos adequados à verificação de peso e estatura, EXCETO

- (A) Solicitar ao paciente que mantenha os pés unidos e centralizados durante a verificação da altura.
- (B) Solicitar ao paciente que realize sua própria pesagem.
- (C) Orientar o paciente que se mantenha em posição ereta na verificação da altura.
- (D) Auferir previamente a balança, além de observar o piso limpo e protegido com papel toalha.
- (E) Verificar em pacientes internados com controle diário se estão em jejum.

13 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre as precauções-padrão.

- () Considera-se qualquer pessoa como potencialmente infectada ou suscetível à infecção.
- () Lavar as mãos é o procedimento mais importante para o controle da infecção cruzada.
- () Deve-se reencapar ou dobrar agulhas para jogá-las no lixo.
- () Nem todos os profissionais de saúde precisam adotar as precauções-padrão.

A sequência correta é

- (A) V - V - F - F.
- (B) V - F - V - V.
- (C) F - V - F - V.
- (D) F - F - V - V.
- (E) V - V - V - F.

14 Numere os parênteses em ordem crescente, para identificar a sequência correta de processamento de artigos segundo a norma vigente.

- () Inspeção visual
- () Artigo sujo
- () Desinfecção/esterilização
- () Lavagem
- () Preparo e embalagem
- () Secagem
- () Armazenagem

A sequência correta é

- (A) 1-2-6-3-5-4-7.
- (B) 4-1-6-2-5-3-7.
- (C) 1-2-3-4-7-5-6.
- (D) 4-5-6-2-3-1-7.
- (E) 3-4-5-1-7-2-6.

15 Qual é a finalidade de se observar a ordem e a limpeza no ambiente hospitalar?

- (A) Evitar infecção hospitalar.
- (B) Proceder à desinfecção.
- (C) Oferecer ambiente limpo, agradável, mas não necessariamente seguro.
- (D) Proceder à esterilização.
- (E) Obter a mínima eficiência no trabalho, mantendo os materiais em ordem.

16 O material necessário para a arrumação do leito aberto é o seguinte:

- (A) hamper, toalha de banho e rosto, cuba rim, lençol de baixo e sobrelençol.
- (B) hamper, cuba rim, lençol de baixo, colcha e cobertor.
- (C) lençol de baixo, sobrelençol, colcha, fronha, travesseiro, impermeável e lençol móvel.
- (D) lençol de baixo, sobrelençol, cuba rim, comadre ou papagaio, impermeável e lençol móvel.
- (E) lençol de baixo, sobrelençol, comadre ou papagaio, toalhas de banho e rosto, travesseiro, cobertor e impermeável.

17 Na prevenção e controle de infecção, devem ser adotados hábitos simples, como:

- (A) usar anéis, pulseiras e demais adereços, pois eles não interferem no controle da infecção.
- (B) deixar os cabelos soltos, pois essa prática não favorece a contaminação.
- (C) as unhas não necessitam estar curtas e aparadas.
- (D) lavar as mãos antes de realizar qualquer procedimento.
- (E) encostar-se ou sentar-se na cama do paciente.

18 A técnica correta para lavagem de mãos é a seguinte:

- (A) abrir a torneira, ensaboar as mãos, realizar o primeiro enxágue, ensaboar novamente as mãos, friccioná-las por 30 segundos, enxaguar e secar com papel toalha e utilizar o próprio papel para fechar a torneira.
- (B) abrir a torneira, molhar e ensaboar as mãos, friccioná-las por 30 minutos, observando, dorso, polegar, ponta dos dedos, enxaguar demoradamente e secar com papel toalha e fechar a torneira.
- (C) abrir a torneira com papel toalha, molhar e ensaboar as mãos, friccioná-las por 30 a 60 segundos, observando palma, dorso, interdigitos, ponta dos dedos, enxaguar e secar com papel toalha, fechar a torneira.
- (D) abrir a torneira, ensaboar as mãos, friccioná-las, lavá-las novamente, observando palma e dorso, enxaguar e fechar a torneira.
- (E) abrir a torneira, molhar e ensaboar as mãos, friccionar de 15 a 30 segundos, observando palma, dorso, interdigitos, polegar, ponta dos dedos e punhos, enxaguar e secar com papel toalha e utilizar o próprio papel para fechar a torneira.

19 Quais são os materiais de consumo usados em unidades hospitalares?

- (A) Algodão, esparadrapo, gaze, chumaço, papel toalha, cuba redonda e cuba rim.
- (B) Seringas e agulhas descartáveis, pinças, micropore, papagaio ou comadres.
- (C) Seringas e agulhas descartáveis, esparadrapo, algodão, máscaras e luvas.
- (D) Sabão, gaze, estetoscópio, pacote de curativo, aparelho de eletrocardiograma.
- (E) Lápis, borracha, folhas de ofício, clipes, tesouras, espelhos de inox, pinças hemostáticas.

20 Quanto à utilização do papagaio, está CORRETO afirmar que ele é de uso

- (A) individual e é trocado a cada seis horas.
- (B) individual e esterilizado a cada seis horas.
- (C) coletivo, mas é trocado a cada turno.
- (D) individual e fica guardado em local apropriado.
- (E) coletivo e esterilizado a cada seis horas.

21 Qual procedimento deve ser observado pelo auxiliar de saúde no momento de o paciente alimentar-se?

- (A) O profissional deve certificar-se da dieta prescrita.
- (B) O profissional deve servir o alimento que o familiar trouxe do domicílio.
- (C) O profissional deve orientar o paciente para aguardar o familiar para servi-lo.
- (D) O profissional deve auxiliar sempre o paciente a alimentar-se, independente do seu estado de saúde.
- (E) O profissional não necessita estimular a alimentação nem a mastigação do paciente.

22 Quanto à limpeza das bandejas utilizadas com medicamentos, pode-se afirmar que

- (A) esse procedimento consiste em lavar as bandejas somente com água e sabão.
- (B) elas devem ser limpas apenas com álcool 90° e panos limpos.
- (C) elas devem ser limpas com clorexidina a 2% e enviadas para a esterilização.
- (D) esse processo tem como finalidade retirar a sujeira, eliminar micro-organismos e prevenir infecções.
- (E) esse procedimento tem como principal finalidade manter o ambiente agradável e dar suporte à enfermagem.

23 Conforme as orientações das boas práticas de limpeza hospitalar,

- (A) movimentos de vaivém com exaustiva fricção devem ser utilizados.
- (B) as paredes devem ser limpas de baixo para cima e os pisos dos quartos da porta para os fundos.
- (C) a limpeza é iniciada pelo piso e após são limpas as paredes.
- (D) a limpeza deve ser iniciada sempre da área menos contaminada para a mais contaminada.
- (E) a varredura a seco é a aconselhada para os corredores.

24 O serviço de higiene e limpeza é feito de acordo com as orientações da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Essas orientações incluem, EXCETO

- (A) padronização dos produtos utilizados para limpeza.
- (B) participação no processo de elaboração das técnicas cirúrgicas.
- (C) atualização do manual de procedimentos técnicos de limpeza.
- (D) cumprimento das técnicas de controle de infecção.
- (E) indicação do uso apropriado de germicidas.

25 NÃO é atribuição do auxiliar de saúde

- (A) lavar material utilizado na unidade.
- (B) controlar e repor materiais de consumo.
- (C) puncionar acesso venoso.
- (D) fazer limpeza diária dos carros e mesas auxiliares.
- (E) levar prescrições médicas à farmácia.

26 Em qual alternativa estão identificados somente artigos hospitalares não críticos?

- (A) Cubas e bacias - fibroscópios e endoscópios.
- (B) Endoscópios - espéculos - equipamentos de anestesia.
- (C) Agulhas - catéteres - broncoscópios.
- (D) Instrumental cirúrgico - equipos de solução - torneirinhas.
- (E) Comadre - papagaio - termômetro - cubas - bacias.

27 De acordo com a Normativa 95 (N95), as precauções respiratórias para aerossóis exigem

- (A) precauções-padrão, quarto semiprivativo e máscara apropriada.
- (B) quarto semiprivativo e precauções-padrão, apenas.
- (C) precauções-padrão, quarto privativo, manter a porta fechada e máscara apropriada.
- (D) lavagem das mãos, utilização de luvas e a porta pode ser mantida aberta.
- (E) quarto comum, máscara cirúrgica comum e porta entreaberta.

28 Quanto às luvas de procedimento, pode-se afirmar que são

- (A) estéreis, limpas e usadas para proteção profissional.
- (B) limpas, não esterilizadas e usadas para proteção profissional.
- (C) conhecidas como cirúrgicas e indicadas para procedimentos invasivos.
- (D) limpas, não esterilizadas e com cuidado especial para calçá-las.
- (E) esterilizadas e utilizadas na manipulação de material estéril.

29 A limpeza da Unidade, na alta do paciente, deve abranger:

- (A) parte interna e externa da mesa de cabeceira, travesseiro impermeável, colchão, cabeceira da cama, grades laterais, estrado, pés da cama, paredes adjacentes à cama, cadeira e escadinha.
- (B) parte interna da mesa de cabeceira, travesseiro impermeável, colchão, paredes adjacentes à cama e cadeira.
- (C) colchão, travesseiro impermeável, estrado, cabeceira da cama, escadinha e cadeira, além de poltronas e armários do paciente.
- (D) parte externa da mesa de cabeceira, grades laterais, colchão, estrado, cadeira e escadinha.
- (E) parte interna e externa da mesa de cabeceira, cabeceira da cama, estrado, grades laterais, cadeira e escadinha.

30 A arrumação da cama fechada é indicada para receber

- (A) paciente sob narcose.
- (B) paciente comatoso.
- (C) paciente operado.
- (D) novo paciente.
- (E) paciente submetido a procedimentos diagnósticos.

31 Na limpeza da unidade do paciente, deve-se

- (A) limpar com solução detergente, sem necessidade de remover o resíduo.
- (B) seguir do local mais contaminado para o menos contaminado.
- (C) executar a limpeza com luvas de procedimento, colocar a superfície já limpa sobre outra limpa.
- (D) executar a limpeza com luvas estéreis, seguindo do local mais limpo para o mais contaminado.
- (E) realizar nas superfícies movimentos amplos e em sentido de vai e vem.

32 Quais espaços são denominados áreas críticas hospitalares?

- (A) Isolamentos, enfermarias e ambulatórios.
- (B) Centro cirúrgico, ambulatórios e sala de recuperação pós-anestésica.
- (C) Almojarifado, setor de hemodiálise e banco de leite.
- (D) Enfermarias, banco de sangue e centro obstétrico.
- (E) Unidades de tratamento intensivo, centro cirúrgico e centro obstétrico.

33 Sobre a esterilização, está CORRETO afirmar que esse processo

- (A) se aplica especificamente a objetos inanimados, podendo ser feita apenas uma esterilização parcial.
- (B) é utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana por meio de agentes físicos ou químicos.
- (C) é utilizado em superfícies como mesas e bancadas.
- (D) tem a pasteurização como a forma mais utilizada.
- (E) é feito por meio da imersão em soluções germicidas.

34 Ao auxiliar o transporte de pacientes para exames complementares em maca, deve-se

- (A) observar o jejum de 8 horas e suspender as medicações do paciente.
- (B) encaminhar o paciente sempre na posição fowler.
- (C) retirar soluções e sondas para o transporte.
- (D) ter a solicitação do médico e o prontuário do paciente.
- (E) retirar joias e solicitar que o paciente esvazie a bexiga, retirando-se drenos e sondas.

35 Ao encaminhar material coletado para exames complementares, esse material deve estar

- (A) rotulado com data e hora da coleta e com a requisição do exame.
- (B) rotulado com nome completo, registro, leito e unidade do paciente, juntamente com a requisição do exame.
- (C) rotulado com nome completo, registro, unidade do paciente e com data e hora da coleta.
- (D) devidamente rotulado com nome e a idade do paciente.
- (E) dentro de caixa de isopor com temperatura a 40° C.

36 Quais são equipamentos necessários para a esterilização de materiais?

- (A) Centrífuga, geladeiras, mesas e balcões, máquina de lavar e secar aventais, estufas, suportes com cestas de alumínio.
- (B) Carros de inox, carros de anestesia, carro de emergência, lavadora e secadora de materiais e de roupas.
- (C) Autoclaves, carros e suportes de alumínio, estufas.
- (D) Máquinas de lavar material e roupas, secadora, carro de emergência, mesas e balcões.
- (E) Máquina de lavar material, autoclaves e estufas, carros de aço inoxidável, mesas e balcões, suportes com cesta inox.

37 São elementos necessários na Central de Material e Esterilização:

- (A) limpeza - separação - lavanderia - empacotamento - esterilização - distribuição.
- (B) lavanderia - preparo - esterilização - distribuição - copa - secretaria.
- (C) recepção de material contaminado - empacotamento - assepsia - medicação - desinfecção - guarda.
- (D) área de recepção - limpeza - preparo - esterilização - guarda - distribuição de material - secretaria.
- (E) separação e empacotamento - triagem - esterilização - distribuição - secretaria - copa.

38 Assinale a afirmativa CORRETA em relação ao material esterilizado.

- (A) É desnecessária a limpeza por ação mecânica em materiais submersos por 30 minutos em detergente.
- (B) O material contaminado não necessita ser mergulhado em solução desinfetante antes da limpeza.
- (C) Ao proceder à limpeza de drenos, sondas e cânulas, deve-se fazer a limpeza interior.
- (D) Os aventais cirúrgicos devem ser, na Central de Material e Esterilização, lavados e empacotados.
- (E) A limpeza de materiais tem uma rotina específica, independente do tipo.

39 A esterilização por meios químicos

- (A) não necessita que o material fique totalmente imerso na solução.
- (B) é o método mais seguro de esterilização.
- (C) não necessita que o material seja lavado antes de colocar na solução.
- (D) deve ser praticada somente quando as outras formas causam danos ao instrumental ou material.
- (E) não necessita que se enxague o material, sendo necessário deixá-lo secar por 2 dias.

40 Na recepção e entrega de fármacos, deve-se cuidar que sempre sejam

- (A) encaminhadas juntas as prescrições médicas e as receitas, observando nome, registro, leito e unidade do paciente.
- (B) usadas luvas estéreis na busca e na recepção.
- (C) usados avental e luvas de procedimento na recepção.
- (D) deixados sempre em caixa de isopor com gelo até a unidade.
- (E) entregues os fármacos diretamente ao paciente.