Residência em Saúde UFSM

Uni/Multiprofissional

ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

2023

→ Bloco A ←

1

O Decreto 7.508/2011 regulamenta a Lei 8080/90 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento em saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

Qual das alternativas abaixo integra corretamente as disposições do Decreto 7.508/2011?

(a) A atenção primária é responsável pela integralidade do cuidado em todo o território nacional.

(b) As regiões de saúde são formadas por municípios com perfil epidemiológico e população equivalente, respeitando-se as macrorregiões de saúde estabelecidas pela Lei 8080/90.

(c) As redes de saúde são os fluxos pactuados para serviços hospitalares entre as regiões de saúde no território dos Estados da Federação.

(d) O acesso universal e igualitário será ordenado pelas Coordenadorias Regionais de Saúde.

(e) A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.

2

O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, em seu artigo 9º, define as portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente todas as portas de entrada previstas no artigo 9º do Decreto 7.508/2011.

(a) Serviços de atenção primária, serviços de urgência e emergência, serviços de atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto.

(b) Serviços de atenção primária, hospitalares de baixa e média complexidade e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

(c) Serviços de atenção primária, serviços de urgência e emergência.

(d) Serviços de atenção primária, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), SAMU e emergências hospitalares.

(e) Serviços de atenção psicossocial, de urgência e emergência e serviços especiais de acesso aberto.

3

De acordo com o artigo 1º da Lei 8142/90, o SUS conta com duas instâncias colegiadas.

Qual alternativa apresenta corretamente as duas instâncias colegiadas do SUS descritas na lei supracitada?

(a) Conferências de Saúde e Comissões Intergestores.

(b) Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.

(c) Secretarias de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde.

(d) Comitês de Humanização e Colegiados Gestores.

(e) Conselhos de Saúde e Câmaras Técnicas do Ministério da Saúde.

4

O artigo 9º da Lei 8080/90 dispõe sobre a Direção do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo. Em relação à Direção do SUS é correto afirmar que

(a) no âmbito da União, a direção do SUS é exercida por meio da cogestão entre o Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde.

(b) nos Estados e no Distrito Federal, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da saúde, Secretarias de Estados e Secretaria Distrital.

(c) no âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde e, no âmbito dos Estados, pelas respectivas Secretarias de Saúde.

(d) nos municípios, a direção do SUS é realizada na forma de cogestão entre Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde.

(e) em todas as instâncias de governo, a direção do SUS é exercida pela Comissão Intergestores equivalente.

5

De acordo com a Lei 8.142/90, os Conselhos de Saúde são órgãos compostos por representantes de vários segmentos da sociedade.

Qual alternativa corresponde às características dos Conselhos de Saúde dispostas na Lei 8.142/90?

(a) Os Conselhos de Saúde são órgãos que integram o Poder Legislativo da União, Estados e Municípios.

(b) Os Conselhos de Saúde são órgãos consultivos e de fiscalização do SUS, atuando em conjunto com a Vigilância Sanitária do município.

(c) A composição dos Conselhos de Saúde prevê que a participação dos usuários seja de pelo menos 50% do número total de conselheiros.

(d) Os trabalhadores, os gestores e os prestadores de serviço formam 40% da composição dos Conselhos de Saúde.

(e) Os Conselhos de Saúde são deliberativos e permanentes, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

→ Anotações ←

UFSM

6

De acordo com Brasil (2018), a Promoção da Saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) se constituiu como o grande marco da luta pela universalização do sistema de saúde e pela implantação de políticas públicas em defesa da vida. A partir daí, a saúde tornou-se um direito social irrevogável, como os demais direitos humanos e de cidadania. Nesse contexto, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída pela Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006, e redefinida pela Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014. A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo. Com relação a esse referencial apresentado no contexto acima, com destaque à ultima Portaria citada, considere as alternativas a seguir.

I - A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.

II - É objetivo da PNPS valorizar os saberes populares e as práticas integrativas e complementares, em detrimento dos saberes e práticas tradicionais.

III - É diretriz da PNPS o apoio à formação e à Educação Permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e trabalhadores de saúde.

IV - A regulação do acesso é considerada como um dos Eixos Operacionais da PNPS.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I e III.

(b) apenas II e IV.

(c) apenas III e IV.

(d) apenas I, II e III.

(e) apenas I, II e IV.

7

De acordo com Gonçalves et al. (2020), apesar de a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) estar institucionalizada no Brasil e ter sido revisada com a Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, é necessário avançar em ações de promoção da saúde no cotidiano de estados e municípios, pois sua prática ainda possui muitos desafios a serem conquistados. Em relação a esses desafios e perspectivas para a Promoção da Saúde no Brasil, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) É necessário superar o modelo tradicional ainda hegemônico do setor saúde, centrado na doença e na assistência, considerando que as ações de promoção da saúde desenvolvidas não foram ainda conso-lidadas, de forma a alterar de forma expressiva o modo de produzir saúde e de enfrentar os determinantes sociais do processo saúde-doença.

( ) A prevenção e a promoção da saúde, por possuírem um enfoque mais amplo e abrangente, devem procurar identificar os macrodeterminantes do processo saúde-doença, buscando transformá-los favoravelmente na direção da saúde.

( ) As ações de promoção e prevenção precisam ser realizadas de forma articulada com outras políticas públicas, com as demais esferas de governo e com a sociedade civil organizada.

( ) A reorientação dos serviços de saúde requer organização e mudança de atitude, com a adoção de uma postura abrangente por parte dos profissionais de saúde, respeitando as necessidades individuais e comunitárias, além da abertura de canais entre o setor saúde e os setores sociais, políticos, econômicos e ambientais.

A sequência correta é

(a) F – V – F – V.

(b) V – V – F – V.

(c) F – V – V – F.

(d) V – F – V – V.

(e) V – F – V – F.

8

Segundo o Manual desenvolvido conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde e os países que perseguem iniciativas nacionais para a qualidade dos cuidados de saúde (OMS, 2020), a formulação, aperfeiçoamento e execução de Políticas e Estratégias Nacionais para a Qualidade dos Cuidados (PENQ) são uma prioridade para os países que lutam para melhorar o desempenho dos seus sistemas de cuidados em saúde. O Manual acrescenta a importância de desenvolver e institucionalizar uma "cultura da qualidade" nas organizações e em todo o sistema de saúde, como meio para uma mudança sustentável e significativa. Destaca que não existe uma definição única do que é uma cultura da qualidade, mas esta tem sido descrita como "uma organização que cria um ambiente de trabalho _____, onde as ideias e as boas práticas sejam_____, onde o ensino e a investigação sejam_____ e onde a_____ apenas excepcionalmente seja usada."

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(a) respeitoso e flexível - partilhadas - estimulados - culpabilização.

(b) respeitoso e flexível - incentivadas - valorizados - repreensão.

(c) aberto e participativo - partilhadas - valorizados - culpabilização.

(d) respeitoso - flexibilizadas - considerados - advertência.

(e) aberto e participativo - incentivadas - considerados - repreensão.

9

No que se refere ao direito da população à saúde integral e no cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS, muito tem sido realizado por parte de todos os serviços e profissionais que compõem o sistema de saúde brasileiro, contudo ainda são vários os desafios para garantir o que preconiza a Constituição Federal de 1988. Neste contexto, a territorialização é um dos desafios da integração de ações entre a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2018).

Sobre a territorilização está INCORRETO afirmar que

(a) o território é aquele que vai além das questões geográficas, incluindo o conjunto de relações sociais, comportamentais e psicológicas que o indivíduo estabelece.

(b) é função das equipes de vigilância epidemiológica o mapeamento de riscos e vulnerabilidades do território, cabendo às equipes da UBS recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(c) o território é o espaço vivo e dinâmico, onde as pessoas estudam, trabalham, estabelecem relações e redes sociais, mantêm estilos de vida, hábitos, crenças e cultura.

(d) a territorialização tem, dentre suas premissas e pressupostos, a identificação com a comunidade na qual a equipe exerce seu papel de promotora de saúde.

(e) no contexto da ESF, é responsabilidade de todos os profissionais da equipe participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidade.

10

O ano de 2018 foi um momento de profunda reflexão sobre a situação dos sistemas de saúde e, sobretudo, sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), dado que marca não apenas os 40 anos da declaração de Alma-Ata, mas também os 30 anos do SUS no Brasil e os 70 anos do National Health Service (NHS) no Reino Unido. Entretanto, se os aniversários de Alma-Ata e do NHS são marcados pela reafirmação da cobertura universal de saúde como meta e pelo reconhecimento do papel da APS no alcance dessa meta, não existe igual clareza sobre qual é a visão do Brasil para o futuro de seu sistema de saúde. Estudos definem recomendações para uma APS forte no SUS (OPAS, 2020).

Em relação a essas recomendações assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) Ampliar formas de acesso à APS, priorizando acesso presencial e horário estendido.

( ) Promover apoio assistencial às equipes de APS (por exemplo: cuidado compartilhado, interconsultas, telemonitoramento, NASF, matriciamento, ...), de forma presencial ou a distância.

( ) Ampliar a atuação clínico-assistencial da categoria médica na APS, com a utilização de protocolos clínicos baseados na melhor evidência científica disponível.

( ) Desenvolver sistema de regulação centrado na APS, com ênfase em tecnologias da informação e comunicação e protocolos clínicos de regulação, com qualificação do processo de referência e contrarreferência.

A sequência correta é

(a) V – V – F – V.

(b) F – V – F – V.

(c) F – V – V – F.

(d) V – F – V – V.

(e) V – F – V – F.

→ Anotações ←

UFSM

→ Bloco B2 ←

11

Considerando a infecção causada por *Listeria monocytogenes* em animais e humanos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) A bactéria é predominantemente veiculada por objetos perfurocortantes e fômites, tanto em animais como em humanos.

( ) A enfermidade acomete, principalmente, indivíduos imunossuprimidos, idosos, portadores de doenças crônico-degenerativas e gestantes.

( ) Para realizar o diagnóstico microbiológico, histopatológico e/ou molecular é preconizado o envio de fragmentos de encéfalo, fígado, baço, rins e líquor, de animais necropsiados.

A sequência correta é

(a) F - V - F.

(b) F - V - V.

(c) V - F - F.

(d) V - V - V.

(e) F - F - F.

12

O impacto da estomatite vesicular (EV) em saúde animal deve-se principalmente à semelhança clínica com a febre aftosa, resultando em prejuízos socioeconômicos em razão de barreiras e quarentenas impostas, interferindo no intercâmbio comercial dos animais e seus produtos e subprodutos. Com relação a esse contexto, considere as afirmativas a seguir.

I. Diferentemente da febre aftosa, a EV não necessita ser notificada às autoridades sanitárias oficiais.

II. A EV acomete exclusivamente os ruminantes, tendo difusão limitada, incidência esporádica e baixa morbidade.

III. A transmissão do vírus aos humanos ocorre pelo contato de secreção dos animais infectados, e as manifestações clínicas no homem assemelham-se à gripe.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas II e III.

(e) I, II e III.

→ Anotações ←

UFSM

13

As arboviroses transmitidas por mosquitos culicídeos têm sido consideradas como problemas relevantes de saúde pública no mundo. As afirmativas abaixo referem-se às infecções transmitidas por esses mosquitos, EXCETO

(a) no ciclo silvestre da febre amarela nas Américas a transmissão do agente viral é mantida exclusivamente por intermédio do mosquito *A. aegypti* para os macacos.

(b) a dengue, conhecida como a "febre quebra-ossos", é uma infecção transmitida por *A. aegypti* e também por *Aedes albopictus*.

(c) o agente etiológico da enfermidade chicungunya, além da via vetorial, é transmitido ao homem por via vertical e transfusional.

(d) no modo de transmissão do vírus causador da Zika, além do vetor *A. aegypti*, a doença também pode ser transmitida por via sexual de uma pessoa infectada para seus parceiros.

(e) na Zika, além da transmissão vetorial, observa-se a transmissão vertical que pode gerar malformações e diferentes manifestações clínicas no feto, incluindo aborto.

14

Conforme o Decreto nº 7.217 de 2010 (Casa Civil), que regulamenta as diretrizes de saneamento básico, assinale a alternativa correta.

(a) Não constitui serviço público as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, excluindo o manejo de resíduos realizados pelo gerador.

(b) A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água poderá também ser alimentada por outras fontes.

(c) Na existência de rede de abastecimento de água pública, não serão admitidas quaisquer instalações hidráulicas prediais com objetivo de reuso de efluentes.

(d) A publicidade dos documentos, tais como relatórios, estudos e decisões referentes à regulação ou à fiscalização dos serviços, deverá ser assegurada aos cidadãos.

(e) Os gestores municipais e o controle social definirão os parâmetros e padrões de potabilidade da água, estabelecendo os procedimentos e responsabilidades do controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano.

15

Em relação à enfermidade criptococose, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) A enfermidade é uma micose de evolução aguda, subaguda ou crônica, e a principal forma de infecção é a via aerógena.

( ) Entre os animais domésticos, o gato é a espécie na qual se observa maior prevalência dos casos da doença, sendo que as infecções virais por FIV e FeLV constituem fatores predisponentes para criptococose.

( ) A profilaxia desta infeção é complexa, uma vez que é recomendado evitar o acesso dos indivíduos suscetíveis aos locais com excreta de aves, especialmente pombos.

A sequência correta é

(a) V - V - V.

(b) V - F - F.

(c) F - V - V.

(d) V - V - F.

(e) F - F - F.

16

As radiações _____ ocorrem pela excitação dos átomos do material e decorrem de um campo eletromagnético vibratório. Entre os principais tipos dessa radiação incluem-se_____, _____ e _____ . Assinale a alternativa que preenche adequa-damente as lacunas.

(a) ionizantes - raios x - aceleradores lineares - raios gama

(b) não ionizantes - ultravioleta - infravermelho - micro-ondas

(c) ionizantes - ultravioleta - infravermelho - laser

(d) não ionizantes - raios alfa - raios beta - laser

(e) não ionizantes - raios x - raios beta - aceleradores lineares

17

Uma grande variedade de agentes biológicos pode ser responsável pela ocorrência de doenças ocupacionais infecciosas em profissionais de saúde. Associe as vias de transmissão listadas na coluna da esquerda com os agentes das principais doenças ocupacionais listadas na coluna da direita.

(1) via respiratória

(2) via fecal-oral

(3) via sanguínea-parenteral

( ) *Clostridium dificile*

( ) *Mycobacterium tuberculosis*

( ) *Salmonella* spp.

( ) vírus da hepatite B

( ) vírus da hepatite A

( ) vírus da febre Lassa (arenavírus)

A sequência correta é

(a) 3 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.

(b) 2 - 1 - 2 - 3 - 2 - 3.

(c) 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3.

(d) 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3.

(e) 2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 1.

18

A caracterização preliminar de um resíduo químico (líquido e gasoso) numa primeira abordagem deve ser baseada nas características abaixo, EXCETO

(a) corrosividade.

(b) inflamabilidade.

(c) reatividade.

(d) toxicidade.

(e) viscosidade.

19

Segundo Mastroeni (2005), num programa de gerenciamento dos riscos ocupacionais ligados ao manuseio de perfurocortantes, existem diretrizes e estratégias de ação a serem seguidas pelas equipes de trabalho. As principais estratégias de controle das práticas de trabalho estão listadas abaixo, EXCETO

(a) fornecer treinamentos nas precauções padrões.

(b) desenvolver as habilidades técnicas necessárias à adoção de práticas seguras.

(c) identificar os padrões de ocorrências das tendências do risco associado à avaliação dos critérios dos materiais com design seguro.

(d) monitorar a adesão às práticas seguras.

(e) fornecer informações (feedback) do desempenho profissional em relação à adoção das práticas seguras.

20

Um incêndio é classificado de acordo com o tipo de material envolvido e o tipo de agente extintor usado para a sua extinção. Sobre os incêndios da classe C é correto afirmar que

(a) são incêndios produzidos por materiais sólidos comuns como, por exemplo, tecido, papel, madeira e plástico.

(b) são incêndios produzidos em líquidos ou gases inflamáveis como, por exemplo, álcool, éter e gasolina.

(c) são incêndios que ocorrem em materiais pirofosfóricos em contato com o ar ou com a produção de faíscas como, por exemplo, titânio, zinco e fósforo branco.

(d) são incêndios para os quais se utiliza água como agente extintor, pois atua diminuindo o calor e promovendo o resfriamento.

(e) são incêndios com a presença de equipamentos elétricos energizados como, por exemplo, centrífugas, estufas, computadores e refrigeradores.

21

Em relação aos componentes do manejo integrado de roedores urbanos, considere as afirmativas a seguir.

I. Inspeção do local e identificação da(s) espécie(s) infestante(s).

II. Medidas preventivas e corretivas (antirratização).

III. Uso de raticidas em pó de contato para aplicação nas trilhas e locais de passagem dos roedores ao redor das edificações.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e II.

(e) I, II e III.

22

Diferentes tipos de vírus entéricos estão presentes em águas contaminadas por esgoto e podem causar uma variedade de doenças no homem. Entre os vírus de maior ocorrência na água utilizados como indicadores de qualidade da água estão:

(a) rotavírus, adenovírus, enterovírus e anelovírus.

(b) vírus da hepatite E, lyssavírus, adenovírus e rotavírus.

(c) coronavírus, flavivírus, lyssavírus e adenovírus.

(d) coronavírus, rotavírus, lyssavírus e adenovírus.

(e) vírus da hepatite E, rotavírus, adenovírus e flavivírus.

23

Segundo o "Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais, do Ministério da Saúde" (2016), com qual técnica é realizado o diagnóstico laboratorial oficial da febre maculosa brasileira e toxoplasmose?

(a) Coproparasitologia.

(b) Imunofluorescência direta.

(c) Imunofluorescência indireta.

(d) Imunoperoxidase.

(e) Aspiração de linfonodo.

24

O Código de Ética do Médico Veterinário regula os direitos e deveres do profissional em relação à comunidade, ao cliente, ao paciente, a outros profissionais e ao meio ambiente. São princípios fundamentais da ética do médico veterinário as enunciadas abaixo, EXCETO

(a) defender a dignidade profissional, quer seja por remuneração condigna, por respeito à legislação vigente ou por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético da profissão.

(b) exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade.

(c) denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente.

(d) manter-se regularizado com suas obrigações legais junto ao seu CRMV.

(e) usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal e evitando sofrimento e dor.

25

Dentre os direitos do Médico Veterinário estabelecidos no Código de Ética da profissão está a previsão de livre escolha de seus clientes ou pacientes. Entretanto, em algumas situações o Médico Veterinário NÃO poderá se recusar a atender. Isso acontecerá quando:

I. há perigo imediato para a vida do animal.

II. outro colega requisitar espontaneamente sua colaboração.

III. seu superior hierárquico na Clínica ou Hospital Veterinário determinar.

IV. não houver outro médico veterinário na localidade onde exerça sua atividade.

Estão corretas

(a) apenas I e II.

(b) apenas I e III.

(c) apenas III e IV.

(d) apenas I, II e IV.

(e) apenas II, III e IV.

→ Bloco C2 ←

26

A cicatrização óssea indireta é caracterizada pela formação de tecido conjuntivo fibroso e de calo cartilaginoso na área da fratura. Com relação a esse tipo de cicatrização de fraturas, considere as afirmações a seguir.

I. Essa forma de cicatrização ocorre em um ambiente mecânico instável, causado pela movimentação de segmentos ósseos.

II. O hematoma e os tecidos de granulação possuem alta tolerância ao estresse no foco da fratura e podem resistir à deformação de até 100%.

III. Essas falhas são preenchidas inicialmente por uma rede de osso fibroso, mas, em torno de 7 a 8 semanas, esse osso mecanicamente frágil inicia um remodelamento.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas II e III.

(e) apenas I e II.

27

As considerações para a seleção da sutura incluem a duração do tempo em que ela será necessária para recuperação do tecido e para a prevenção do risco de infecção, efeito do material na cicatrização da ferida e dimensão e força requeridas da sutura.
Com relação a esse contexto, considere as afirmações a seguir.

I. Suturas de monofilamento devem ser usadas para auxiliar a síntase da pele e para evitar o transporte capilar de bactérias para os tecidos mais profundos.

II. As anastomoses vasculares são tipicamente realizadas com o material de sutura absorvível monofilamentado.

III. Órgãos parenquimatosos, tais como fígado, baço e rins, são geralmente suturados com suturas de monofilamento absorvíveis.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e III.

(e) I, II e III.

28

A hérnia diafragmática ocorre quando a continuidade do diafragma é rompida, de forma que órgãos abdominais podem migrar para o interior da cavidade torácica.
Com relação a esse contexto, considere as afirmações a seguir.

I. A maioria das hérnias diafragmáticas em cães e gatos é causada por trauma, particularmente por acidentes com veículos motorizados.

II. O aumento abrupto na pressão intra-abdominal, acompanhado de movimentações forçadas da parede abdominal contra os pulmões inflados (com a glote fechada), produz um grande gradiente de pressão pleuroperitoneal, causando a ruptura do diafragma.

III. O reparo cirúrgico de hérnias diafragmáticas deve ser realizado rapidamente na presença de contusões pulmonares.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e III.

(e) I, II e III.

29

A insuficiência do ligamento cruzado cranial pode apresentar causas degenerativas e traumáticas. As categorias estão inter-relacionadas, pois os ligamentos enfraquecidos pela degeneração são mais suscetíveis ao trauma. A alta incidência de falha nesse ligamento em cães sugere que há uma causa subjacente para a degeneração prematura do ligamento cruzado na maioria dos casos. Com relação a essa afecção, considere as afirmações a seguir.

I. A reconstrução extracapsular consiste em passar um tecido autógeno pela articulação, utilizando o método conhecido como over-the-top (acima do topo).

II. A osteotomia de nivelamento do platô tibial (TPLO) altera a mecânica do joelho, atingindo a estabilização pela contenção ativa (músculos e tendões) da articulação.

III. A lesão do ligamento cruzado contralateral é rara, mesmo se houver alterações radiográficas visíveis na articulação não lesionada.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e II.

(e) I, II e III.

30

A cirurgia reconstrutiva é comumente realizada para fechar defeitos que ocorrem secundários a trauma, para corrigir ou melhorar anomalias congênitas ou após a remoção de neoplasias. Uma variedade de procedimentos de reconstrução estão disponíveis, porém é importante selecionar a técnica para prevenir as complicações e evitar custos desnecessários.

Com relação a esse contexto, considere as afirmações a seguir.

I. Retalhos omentais podem ser usados para cobrir defeitos em tecidos moles, contribuir com a circulação e drenagem, melhorar a cicatrização, controlar adesão e combater a infecção da mesma forma que os retalhos musculares.

II. Enxertos em selo são fragmentos quadrados de pele de espessura parcial aplicados sobre uma ferida em granulação.

III. Enxertos cutâneos de espessura total incluem a epiderme e toda a derme, enquanto enxertos de espessura parcial são compostos de epiderme e uma espessura variável de derme.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas II e III.

(e) I, II e III.

→ Anotações ←

UFSM

31

Os hematomas aurais podem ocorrer em cães ou gatos e geralmente são caracterizados como inchaços cheios de fluidos flutuantes na superfície côncava do pavilhão auricular. A causa do hematoma aural não é bem compreendida, no entanto, em muitos casos, parece ser o resultado de agitação da cabeça ou arranhões no ouvido promovido por dor ou irritação associada à otite externa. Com relação aos oto-hematomas, considere as afirmações a seguir.

I. O tratamento logo após a ocorrência, não é necessário, pois o hematoma poderá ser drenado várias semanas depois, sem ocorrência de fibrose.

II. Os objetivos da cirurgia são remover o hematoma, prevenir a recorrência e manter a aparência natural do ouvido.

III. O tratamento mais comum envolve uma incisão no tecido que cobre o hematoma, evacuando os coágulos de sangue e fibrina, e fixando a cartilagem em justaposição com suturas até a cicatrização do tecido.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas III.

(c) apenas I e II.

(d) apenas II e III.

(e) I, II e III.

32

O tórax é uma das regiões mais comumente lesadas após trauma contuso. Animais com lesões traumáticas que dificultam a respiração, geralmente precisam de estabilização de emergência antes da cirurgia.

Com relação a esse contexto, considere as afirmações a seguir.

I. O toráx instável ocorre quando várias costelas consecutivas são fraturadas, e se movem paradoxalmente com a respiração.

II. Os cães podem sobreviver a uma perda aguda de até 50% do seu volume pulmonar, entretanto eles podem desenvolver acidose respiratória e intolerância ao exercício transitórias.

III. Todas as esternebras craniais e caudais devem ser seccionadas, na esternotomia mediana, permitindo a correta exploração do tórax.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e II.

(e) I, II e III.

33

A cirugia do intestino grosso é indicada para as lesões que causam obstrução, perfuração, inércia colônica ou inflamação crônica. Com relação a esse contexto, considere as afirmações a seguir.

I. As causas mais comuns de obstruções são tumores, intussucepções e massas granulomatosas.

II. A maioria dos animais com doença do intestino grosso apresenta alterações nos resultados de exames laboratoriais, como anemia ou hipoalbuminemia, além de desidratação e alterações eletrolíticas.

III. A colopexia é realizada para criar aderência temporária entre a superfície da serosa do cólon e da parede abdominal, de modo a impedir o movimento caudal do cólon e do reto.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas II.

(c) apenas III.

(d) apenas I e II.

(e) apenas II e III.

34

A intensidade dos efeitos promovidos pelos opioides decorre da afinidade destes com os receptores e atividade intrínseca. Sendo assim, assinale a alternativa que apresente apenas fármacos agonistas totais.

(a) Tramadol, buprenorfina, etorfina e butorfanaol.

(b) Morfina, fentanila, meperidina e remifentanila.

(c) Butorfanol, naloxona, buprenorfina e naltrexona.

(d) Tramadol, metadona, buprenorfina e alfentanila.

(e) Fentanila, alfentanila, nalbufina e morfina.

35

O fármaco que pode promover hipotensão, devido ao efeito antagonista dos receptores alfa 1 adrenérgicos, é _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(a) acepromazina.

(b) tiletamina.

(c) meperidina.

(d) atropina.

(e) dobutamina.

36

Considere as afirmativas a seguir, quanto à fisiologia da dor.

I - A fase de transdução é caracterizada pela transmisão do potencial de ação, do corno dosal da medula até o tálamo.

II - A modulação ocorre no corno dorsal da medula espinhal, que se caracteriza por supressão ou amplificação da resposta sensorial.

III - O desenvolvimento de alodinia e hiperalgesia pode ocorrer quando, na fase de percepção, a dor não é inibida.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas II.

(b) apenas III.

(c) apenas I e II.

(d) apenas II e III.

(e) I, II e III.

37

O fármaco que, em doses baixas, promove diminuição transitória do ritmo sinusal devido ao boqueio dos receptores muscarínicos pré-sinapticos é _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(a) clorpromazina.

(b) atropina.

(c) cetamina.

(d) efedrina.

(e) droperidol.

38

A neostigmina é um fármaco que promove seu efeito inibindo a acetilcolinesterase, utilizado para reversão dos efeitos de um fármaco. Que fármaco é este?

(a) Acepromazina.

(b) Edrofônio.

(c) Dexmedetomidina.

(d) Atracúrio.

(e) Buprenorfina.

39

A técnica que consiste na aplicação de anestésico local por via intravenosa no membro torácico ou pélvico, previamente garroteado, denomina-se. Assinale a alternativa correta

(a) anestesia total intravenosa.

(b) anestesia subaracnoidea.

(c) bloqueio venoso simpático.

(d) anestesia perineural.

(e) anestesia de Bier.

40

Há um fármaco que seu principal efeito analgésico opioide é produzido pelo seu metabólito ativo "M1" e que, nas espécies em que este não é formado em quantidades suficientes, apresenta comprometimento na analgesia opióide. O nome desse fármaco é

(a) tramadol.

(b) nalbufina.

(c) fentanil.

(d) morfina.

(e) meperidina.

→ **Anotações** ←

UFSM

→ **Anotações** ←

UFSM