


Residência em Saúde **UFSM**

Uni/Multiprofissional

***Residência em Área Profissional da Saúde
Uniprofissional – Medicina Veterinária***

Anestesiologia e Cirurgia de Pequenos Animais



2024

→ **Bloco A** ←**01**

“Como foi possível, durante esse período, montar um sistema tão perverso de saúde, que não atende aos interesses de ninguém? Onde o indivíduo não é tratado com o mínimo de dignidade humana, isto é, alguém com nome e sobrenome. Onde todos os homens são transformados em ‘Zé’ e todas as mulheres em ‘dona Maria’.” - Trecho do discurso de Sérgio Arouca na VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986.

Fonte: PAIM, J. S. et al. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2015. (Adaptado)

Com relação ao contexto anterior ao SUS, considere as afirmativas a seguir.

I → As caixas de aposentadorias e pensões (CAPs) garantiam acesso a assistência médica a toda a população.

II → A saúde era tratada mais como caso de polícia do que como questão social.

III → O sistema tinha como marca principal a separação entre as ações de saúde pública e as de assistência médico-hospitalar.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas II.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

02

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), instituída no ano de 2004, representa um marco para a formação e trabalho em saúde no Brasil. Este processo é resultado de lutas e esforços promovidos pelos defensores do tema da educação dos profissionais de saúde, como forma de promover a transformação das práticas do trabalho em saúde.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento? 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_saude_fortalecimento.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2023. (Adaptado)

De acordo com a publicação do Ministério da Saúde citada acima, considere as afirmativas a seguir sobre as principais ações implementadas que visam potencializar a PNEPS.

I → Incentivo à implementação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade por meio do estabelecimento dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES).

II → Atualização da Política Nacional de Atenção Básica no ano de 2017, a qual prevê a Educação Permanente em Saúde como parte do processo de trabalho das equipes que atuam na Atenção Básica.

III → Formalização da incorporação do tema da Educação Interprofissional em Saúde (EIP) na agenda da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).

IV → Lançamento do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS).

Estão corretas

- (A) apenas I e II.
- (B) apenas I e III.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

03

Segundo a Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde (POPES), Portaria SES nº 512, de 29 de julho de 2020, o acesso e/ou a atenção _____ para fins desta política são entendidos como premissa para a promoção da equidade, à medida que compreende que determinadas populações apresentam características relacionais que as _____ de outros segmentos sociais já incluídos na agenda dos serviços de saúde e, para isso, necessitam de diferentes formas de acesso/atenção que contemplem suas _____.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- (A) diferenciada – distinguem – especificidades
- (B) prioritária – assemelham – necessidades
- (C) diferenciada – generalizam – especificidades
- (D) prioritária – generalizam – necessidades
- (E) prioritária – distinguem – especificidades

04

Considerando a Portaria SES nº 512, de 29 de julho de 2020, que aprova a Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Para fins desta política serão consideradas como populações específicas, entre outras: população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais (LGBT), povos indígenas, população em situação de rua, população negra, povos ciganos, população privada de liberdade, egressos do sistema prisional, população de migrantes, refugiados e apátridas e população do campo, da floresta e das águas.
- () Como princípio desta política está a transversalidade enquanto estratégia de articulação, convergência e reforço recíproco entre políticas de saúde.
- () Dentre as diretrizes desta política, está a promoção da cidadania e inclusão com vistas à garantia da proteção dos direitos de populações específicas somente na Atenção Primária à Saúde.

A sequência correta é

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

05

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, foi um marco na participação social na gestão do SUS e no processo de financiamento. De acordo com as informações contidas na lei supracitada, considere as afirmativas a seguir.

I → O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

II → A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

III → A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

06

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, entre eles: a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. No Capítulo II, o decreto trata da organização do SUS. Em relação a este capítulo é correto afirmar que

- (A) as Regiões de Saúde serão instituídas pela União em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores vinculada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- (B) as Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores, sendo definidos pelos entes federativos os limites geográficos, a população usuária das ações e serviços, o rol de ações e serviços que serão ofertados e as respectivas responsabilidades, além dos critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.
- (C) para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, obrigatoriamente e no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, não precisam ser referenciados pelos serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS (Portas de Entrada) de que trata o decreto.
- (E) não poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais.

Anotações

07

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, entre eles: a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. No Capítulo V o decreto trata da articulação interfederativa a qual se materializa por meio das Comissões Intergestoras. Em relação a este capítulo, associe as Comissões Intergestores na coluna à esquerda com as respectivas vinculações na coluna à direita.

- | | |
|---------|---|
| (1) CIT | () No âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. |
| (2) CIB | () No âmbito federal, vinculada ao Ministério da Saúde. |
| (3) CIR | () No âmbito estadual, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. |

A sequência correta é

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) 3 - 2 - 1. | (D) 2 - 3 - 1. |
| (B) 3 - 1 - 2. | (E) 1 - 2 - 3. |
| (C) 2 - 1 - 3. | |

08

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece como ocorre o processo de planejamento e orçamento do SUS.

De acordo com a legislação considere as afirmativas a seguir.

I → O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvindo seus órgãos deliberativos.

II → É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área da saúde.

III → Será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Está(ão) correta(s)

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (A) apenas II. | (D) apenas II e III. |
| (B) apenas I e II. | (E) I, II e III. |
| (C) apenas I e III. | |

09

Segundo a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde (RAS) estrutura-se segundo alguns atributos.

Com base no exposto, associe os atributos na coluna à esquerda com os respectivos conceitos na coluna à direita.

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Primeiro Contato | () lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de um período de anos. |
| (2) Longitudinalidade | () é a disponibilidade de informação a respeito dos problemas de saúde e dos serviços prestados. |
| (3) Integralidade | () é um mecanismo importante porque assegura que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da população. |
| (4) Coordenação | () leva a uma atenção mais apropriada e a melhores resultados de saúde a custos totais mais baixos. |

A sequência correta é

- (A) 4 - 2 - 3 - 1. (D) 2 - 4 - 1 - 3.
(B) 4 - 2 - 1 - 3. (E) 4 - 3 - 2 - 1.
(C) 2 - 4 - 3 - 1.

10

Os atributos requeridos para uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da rede de atenção à saúde, além dos já citados na questão de número 9, incluem

- (A) o genograma, o ecomapa e o planejamento.
(B) o genograma e o ecomapa.
(C) a orientação comunitária e o planejamento.
(D) a centralidade na família, a abordagem familiar e a universalidade.
(E) a centralidade na família, a abordagem familiar e a orientação comunitária.

Anotações

UFSM

→ **Bloco B2** ←**11**

A doença de Lyme é uma zoonose multissistêmica, caracterizada por manifestações clínicas cutâneas, articulares, neurológicas e cardíacas em humanos e animais. É causada por espiroqueta do gênero *Borrelia* e tem como principais vetores os carrapatos do gênero *Ixodes*. Com relação a esse contexto, considere as afirmativas a seguir.

I → Ao contrário das espiroquetas do gênero *Leptospira*, as bactérias *Borrelia* spp. sobrevivem adequadamente no ambiente fora do hospedeiro.

II → Após o repasto sanguíneo do carrapato, *Borrelia* spp. multiplicam-se no local, na pele e em estruturas adjacentes, disseminando-se para outros órgãos; contudo, este microrganismo não atravessa a barreira hemato-encefálica.

III → Por sua característica migratória, os mamíferos silvestres e principalmente as aves podem atuar como disseminadores, carreando carrapatos infectados para novas áreas.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I. (D) apenas II e III.
(B) apenas II. (E) I, II e III.
(C) apenas III.

12

Segundo Monteiro (2017), a febre maculosa é uma doença infecciosa, causada por riquetsias do grupo da febre maculosa, que geralmente se desenvolve em caráter endêmico. O principal agente etiológico dessa enfermidade é a bactéria *Rickettsia rickettsii*. Assinale a alternativa correta.

- (A) A bactéria infecta preferencialmente células dendríticas e macrófagos onde é formado o vacúolo parasitóforo, ocorrendo a lise celular por meio da fosfolipase.
(B) Nos humanos ocorrem erupções cutâneas maculopapulares que aparecem nas extremidades, especialmente na face e nas regiões palmar e plantar.
(C) A transmissão do agente ocorre por carrapatos, pulgas, piolhos e morcegos hematófagos.
(D) A doença manifesta-se predominantemente em cães jovens, apresentando alopecia, infarctamento dos linfonodos, bem como atrofia de baço e fígado.
(E) A capivara e o cão são considerados reservatórios da enfermidade, manifestando sinais clínicos similares aos dos humanos.

Anotações

UFSM

13

Os hantavírus se mantêm na natureza pela infecção crônica de roedores, sendo assintomáticos e dificilmente letais nesses animais.

Considere as alternativas a seguir.

I → O vírus pode ser isolado de pulmões e rins podendo ser eliminado pela saliva, urina e fezes dos indivíduos infectados.

II → A transmissão vertical não ocorre em humanos, contudo foi observada em roedores.

III → A doença tem sido observada em áreas periurbanas, próximas às áreas rurais, principalmente em períodos de seca, quando os roedores invadem os domicílios em busca de alimentos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e III.
- (E) I, II e III.

14

Lutzomyia longipalpis é considerado o principal vetor da Leishmaniose visceral. O flebotomíneo se desenvolve em ambientes terrestres úmidos, como em matéria orgânica, na camada superficial do solo de baixa intensidade luminosa e em árvores. Frente às condições adversas, as _____ podem entrar em _____. As fêmeas se infectam realizando o repasto sanguíneo contendo as formas _____ do protozoário.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) larvas – diapausa – amastigotas
- (B) larvas – aquiescência – promastigotas
- (C) ninfas – diapausa – promastigostas
- (D) larvas – aquiescência – amastigotas
- (E) ninfas – diapausa – amastigotas

15

Associe as formas de transmissão do agente etiológico na coluna à esquerda com os respectivos agentes na coluna à direita.

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| (1) Veiculação hídrica | () <i>Giardia</i> spp. |
| (2) Inalação | () <i>Cryptosporidium</i> spp. |
| (3) Vetores | () <i>Blastomyces dermatitidis</i> |
| | () <i>Leptospira interrogans</i> |
| | () <i>Isospora</i> spp. |

A sequência correta é

- (A) 1 – 1 – 3 – 1 – 3.
- (B) 3 – 3 – 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 1 – 2 – 1 – 3.
- (D) 2 – 2 – 1 – 3 – 1.
- (E) 1 – 1 – 3 – 2 – 2.

16

No contexto das doenças infectocontagiosas e parasitárias, os insetos podem desempenhar um importante papel na transmissão de patógenos tanto para humanos quanto para animais. Associe o vetor na coluna à esquerda com os agentes etiológicos veiculados na coluna à direita.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (1) <i>Xenopsylla cheopis</i> | () <i>Trypanosoma cruzi</i> |
| (2) <i>Triatoma brasiliensis</i> | () <i>Yersinia pestis</i> |
| (3) <i>Anopheles albitalis</i> | () <i>Plasmodium</i> sp. |

A sequência correta é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

17

Segundo o Plano de Contingência para Respostas Emergentes em Saúde Pública por Dengue, Chikungunya e Zica, são considerados fatores relacionados às emergências por arboviroses

I → vulnerabilidade socioambiental da população.

II → capacidade de resposta dos serviços de saúde.

III → competência vetorial dos mosquitos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) I, II e III.

18

Segundo Mastroeni (2005), os resíduos biológicos ou infectantes são classificados como grupo A. Considere as afirmativas a seguir.

I → O subgrupo A1 compreende os resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes da classe de risco 4.

II → O subgrupo A2 enquadra as carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos.

III → O subgrupo A5 inclui os órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com príons.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) I, II e III.

19

Os procedimentos básicos para a minimização dos riscos decorrentes da exposição a agentes infectantes em laboratórios estão listados abaixo, EXCETO

- (A) proibir a pipetagem com a boca, comer, beber, fumar ou guardar alimentos nas geladeiras do laboratório.
- (B) adotar o aterro sanitário como método de tratamento de eleição para minimizar a periculosidade dos resíduos biológicos e químicos.
- (C) realizar a descontaminação das superfícies de trabalho diariamente ou após o derramamento de material viável.
- (D) lavar as mãos após a manipulação de material biológico.
- (E) utilizar adequadamente jalecos e luvas como equipamentos de proteção, para os laboratórios de biossegurança 1 e 2.

20

Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e serão prestados com base nos princípios apresentados a seguir, EXCETO

- (A) integralidade de serviços, englobando abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
- (B) acesso universalizado.
- (C) utilização racional da energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos naturais.
- (D) eficiência e sustentabilidade econômica.
- (E) isenção de controle social.

Anotações

21

Segundo o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses: normas técnicas e operacionais (BRASIL, 2016), as unidades de vigilância de zoonoses (UVZ) devem seguir protocolos para a coleta, armazenamento e envio de amostras biológicas para diagnóstico de zoonoses. Associe a enfermidade na coluna da esquerda com o material e a técnica laboratorial para a realização dos diagnósticos nas UVZ, listados na coluna da direita.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Histoplasmose | () Soro — Teste rápido de plataforma de duplo percurso (TR-DPP) e ensaio imunoenzimático (ELISA). |
| (2) Dirofilariose | |
| (3) Raiva | |
| (4) Leishmaniose Visceral Canina | () Fezes de morcegos e pombo — Inoculação em camundongos e isolamento em meio de cultura. |
| | () Sangue colhido com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) — Teste de Knott modificado. |

A sequência correta é

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) 4 - 1 - 2. | (D) 4 - 1 - 3. |
| (B) 4 - 3 - 2. | (E) 2 - 3 - 4. |
| (C) 3 - 1 - 2. | |

22

A atenção básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção de saúde (RAS), servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade. Segundo a Política de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017), assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () O número de agentes comunitários de saúde por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local.
- () As equipes da atenção básica deverão ser compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e/ou técnicos de enfermagem, além de dentistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

- () Cabe ao médico veterinário supervisionar as ações de técnico e/ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de implementar e manter atualizados rotina, protocolos e fluxos relacionados à sua área de competência na unidade básica de saúde.

A sequência correta é

- (A) V - V - V.
- (B) V - F - F.
- (C) F - V - V.
- (D) V - V - F.
- (E) F - F - F.

23


Em relação à Norma Regulamentadora 32 (NR 32) referente à Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMO).
- () O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.
- () Consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que podem causar efeitos deletérios sobre as células tronco e mesenquimais.

A sequência correta é

- (A) F - V - F.
- (B) F - V - V.
- (C) V - V - F.
- (D) V - F - V.
- (E) V - F - F.

A raiva é uma antroponose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, caracterizada por encefalite progressiva e aguda com letalidade próxima a 100%.



Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. 4. ed. Brasília, 2019. p. 623.

Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_4ed.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2023. (Adaptado)

A figura 1 ilustra a cadeia epidemiológica da doença. _____ são as principais fontes de infecção por raiva em áreas urbanas, enquanto os _____ são responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre. Destes, o ciclo _____ é passível de eliminação por se dispor de medidas eficientes de prevenção, em relação ao homem e à fonte de infecção. Em cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e a morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após o início dos sinais. No cão, a raiva se apresenta de duas formas: a raiva _____, que cursa com inquietação e agressividade, com excitação do sistema nervoso central e preservação da consciência, sialorreia, incoordenação motora, convulsões, paralisia e morte; e a raiva _____, que se apresenta com sinais de paralisia e morte por comprometimento respiratório central. Em bovinos, os sinais geralmente envolvem incoordenação motora, paralisia ascendente de membros pélvicos, decúbito esternal, paralisia de rúmen, salivação, opistótono, nistagmo, ataxia e morte. Em casos de raiva em animais de produção, _____ recomendação de realizar-se a vacinação de cães e gatos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- (A) Caninos e felinos – quirópteros e marsupiais – urbano – furiosa – parálítica – não há.
- (B) Caninos e felinos – quirópteros e primatas – rural – espástica – flácida – há.
- (C) Quirópteros e marsupiais – bovinos e equinos – silvestre – espástica – furiosa – há.
- (D) Caninos e felinos – bovinos e equinos – urbano – parálítica – furiosa – há.
- (E) Quirópteros e marsupiais – bovinos e equinos – rural – furiosa – parálítica – não há.

25

A Resolução nº 1.138, de 16 de dezembro de 2016, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) traz o Código de Ética do Médico Veterinário, em vigor desde 09 de setembro de 2017, que preconiza que os médicos veterinários devem exercer a profissão com integridade, respeito, dignidade e consciência.

Sobre o Código de Ética do Médico Veterinário, é INCORRETO afirmar que

- (A) é princípio fundamental da profissão a denúncia de qualquer forma de agressão aos animais e ao meio-ambiente à autoridade competente.
- (B) é dever do médico veterinário a relação com os demais profissionais, valorizando respeito mútuo e a independência profissional de cada um, buscando o bem-estar social da comunidade.
- (C) é dever do médico veterinário a denúncia pública ao CRMV de qualquer infração ao código de ética e às demais normas e leis que regem o exercício da profissão, ainda que sem fundamentação ou por denúncia anônima.
- (D) é direito do médico veterinário prescrever o tratamento que considere mais indicado, assim como utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessários ao desempenho de suas atividades.
- (E) o médico veterinário deve fornecer ao cliente, quando solicitado, o laudo médico veterinário, relatório, prontuário, atestado, certificado ou resultados de exames complementares, bem como deve dar as explicações necessárias à sua compreensão.

Anotações

UFSM

→ **Bloco C2** ←**26**

Tendo em vista as diferentes afinidades dos opióides por seus receptores e suas ações agonista total, agonista parcial, agonista antagonista e antagonista, assinale a alternativa que demonstra um protocolo anestésico que pode resultar em efeito parcial ou nulo de algum dos fármacos utilizados.

- (A) Medicação pré-anestésica contendo metadona e peridural analgésica com morfina.
- (B) Emprego de fentanila como agente coindutor e infusão de remifentanil ao longo da cirurgia.
- (C) Medicação pré-anestésica com butorfanol e infusão contínua de morfina ao longo da cirurgia.
- (D) Medicação pré-anestésica com nalbufina e analgesia pós-operatória com butorfanol.
- (E) Emprego de fentanila como agente coindutor e analgesia pós-operatória com metadona.

27

Considere as afirmativas a seguir a respeito dos efeitos dos anestésicos halogenados.

I → Todos os anestésicos inalatórios causam diminuição do débito cardíaco de forma dose-dependente.

II → Durante a anestesia geral inalatória, é esperado observar hipotensão nos pacientes.

III → O anestésico geral inalatório que causa os menores efeitos cardiovasculares é o halotano, sendo considerado mais seguro para os pacientes hipovolêmicos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas I e III.
- (E) I, II e III.

28

Durante a recuperação anestésica de um equino submetido a uma anestesia de longa duração em mesa cirúrgica são necessários cuidados especiais.

Considere as afirmativas a seguir.

I → Equinos anestesiados em decúbito dorsal podem ser posicionados em decúbito lateral sobre qualquer lado durante a recuperação anestésica.

II → Equinos anestesiados em decúbito lateral devem ser posicionados sobre o mesmo lado de decúbito no momento da recuperação anestésica, a fim de manter o pulmão mais funcional voltado para cima.

III → Equinos podem necessitar de sedação durante o período de recuperação anestésica para minimizar a ocorrência de agitação.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

29

A anestesia peridural é comumente realizada no espaço intercocccígeo (Co1-Co2), cuja identificação é possível mediante elevação e abaixamento da cauda nos(as)

- (A) ovelhas.
- (B) cavalos.
- (C) cães.
- (D) coelhos.
- (E) papagaios.

30

Tendo em vista os fármacos anestésicos gerais injetáveis, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Alfaxolona. () Fármaco utilizado corriqueiramente em infusão contínua e apresenta sítios de metabolização extra-hepáticas.
- (2) Propofol.
- (3) Etomidato.
- (4) Tiopental. () Fármaco utilizado normalmente em associação com outro fármaco a fim de reduzir mioclonias e excitação e pode promover supressão adrenal.
- () Fármaco que sensibiliza o miocárdio ao efeito de catecolaminas e possui intenso efeito cumulativo.

A sequência correta é

- (A) 1 - 2 - 3.
(B) 2 - 1 - 3.
(C) 2 - 1 - 4.
(D) 2 - 4 - 1.
(E) 2 - 3 - 4.

Anotações**31**

A adequada monitoração transanestésica é de fundamental importância para o bom andamento do procedimento. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São parâmetros a serem monitorados durante o período transanestésico: a frequência respiratória, a fração expirada de gás carbônico e o nível de SpO_2 .
- (B) A frequência cardíaca atesta a atividade do músculo cardíaco com maior ou menor precisão de acordo com o método de monitoração utilizado.
- (C) No eletrocardiograma, a onda P reflete a despolarização dos ventrículos, enquanto o complexo QRS e a onda T refletem a despolarização e repolarização dos átrios, respectivamente.
- (D) A curva pressórica com padrão hipercinético é caracterizada por curvas de alta amplitude, estreitas e com deslocamento da incisura aórtica para a direita.
- (E) A pressão venosa central representa a pressão interna da veia cava cranial e avalia o retorno venoso aórtico direito.

32

De acordo com a anestesia de equinos, considere as afirmativas a seguir.

I → Equinos apresentam menor risco de morbidade e mortalidade perianestésicas quando comparados a cães.

II → Um fator que influencia o índice de morbidade em equinos é o decúbito durante o procedimento e as alterações cardiopulmonares decorrentes deste.

III → Apesar da adoção de medidas preventivas no posicionamento do equino no período transanestésico, a miopatia pode ocorrer pela perfusão periférica inadequada.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas II. (D) apenas II e III.
(B) apenas I e II. (E) I, II e III.
(C) apenas I e III.

33

De acordo com os estágios e planos de anestesia de Guedel, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () O Estágio III é a fase entre o estágio de alerta e a perda da consciência.
- () Os planos 2 e 3 do estágio III são considerados os planos anestésicos cirúrgicos ideais.
- () O plano 4 do estágio III é caracterizado por hipotensão e choque bulbar.
- () O plano 1 do estágio III é representativo de uma anestesia muito profunda.

A sequência correta é

- (A) F - V - F - F.
- (B) F - F - F - F.
- (C) F - V - V - F.
- (D) V - F - V - V.
- (E) V - V - V - V.

34

As luvas de látex servem como barreiras entre o integrante da equipe cirúrgica e o paciente. Entretanto, não devem ser um substituto dos métodos de lavagens de mãos. Sobre as formas de se calçar as luvas, considere as afirmativas a seguir.

I → O método fechado de calçar luvas assegura que a mão nunca entre em contato com a parte externa do avental ou da luva.

II → O método assistido de calçar luvas minimiza a possibilidade da contaminação do avental.

III → O método aberto de calçar luvas é usado durante a cirurgia, quando uma luva deve ser trocada.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

35

O nó é o ponto mais fraco da sutura e consiste em pelo menos duas laçadas superpostas e apertadas.

Com relação a esse contexto, considere as afirmativas a seguir.

I → Em veterinária, os nós com instrumentos são usados mais comumente que os nós com as mãos, pois dessa forma há menos desperdício de sutura.

II → Após a primeira volta do nó, os fios devem ser levantados e tracionados, para que não haja afrouxamento.

III → Os nós realizados com as mãos são particularmente úteis em áreas confinadas ou difíceis de serem alcançadas.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e III.
- (E) apenas II e III.

36

A hérnia perineal ocorre quando os músculos do diafragma pélvico não sustentam a parede retal, permitindo a persistente distensão retal e comprometendo a defecação.

Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir.

I → Qualquer condição que causa esforço pode forçar o diafragma pélvico.

II → O diafragma pélvico é mais forte nos machos que nas fêmeas.

III → Retroflexão da vesícula urinária e aprisionamento visceral requerem cirurgia de emergência.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e III.
- (E) apenas II e III.

37

A uretostomia é a abertura permanente da uretra. Sobre as indicações para esse procedimento cirúrgico, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Neoplasia ou trauma uretral grave.
- () Remoção de cálculos alojados no arco isquiático.
- () Estreitamento uretral.
- () Remoção de cálculo obstrutivo recorrente que não pode ser controlado por medicamento.

A sequência correta é

- (A) V - F - V - V.
- (B) F - V - F - V.
- (C) V - V - F - V.
- (D) V - V - V - F.
- (E) F - F - V - F.

38

Os fixadores esqueléticos externos constituem-se em tratamento versátil e de custo acessível para fraturas de ossos longos, osteotomia corretiva, artrodese articular e imobilização articular temporária.

Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir.

I → Fixadores unilaterais-uniplanares (tipo Ia) geralmente são aplicados na superfície lateral do fêmur ou úmero.

II → Fixadores unilaterais-biplanares (tipo Ib) são aplicados com maior frequência ao rádio e à tíbia.

III → Fixadores bilaterais-uniplanares (tipo II) não podem ser utilizados no rádio e na tíbia.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas I e III.
- (E) apenas II e III.

39

As técnicas de gastropexia são desenvolvidas para aderir o estômago permanentemente à parede abdominal.

Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir.

I → A gastropexia por tubo permite descompressão gástrica pós-cirúrgica e colocação de medicamentos diretamente no estômago em animais inapetentes.

II → A gastropexia de dobra muscular transpassa um retalho seromuscular do antro pilórico ao redor da 11ª ou 12ª costela, no nível da junção costochondral.

III → A serosa gástrica intacta deve estar em contato com a superfície peritoneal intacta para formar adesão permanente.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas II e III.
- (E) I, II e III.

40

O ectrópio pode ser uma condição de desenvolvimento ou uma condição adquirida secundária à formação do tecido de cicatrização ou fadiga do músculo orbicular do olho. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao tratamento cirúrgico de correção do ectrópio.

- (A) Ressecção em cunha.
- (B) Método de Hotz-Celsus.
- (C) Correção em V-Y.
- (D) Blefaroplastia lateral.
- (E) Ressecção da conjuntiva.

