

FOLHETO
COLETÂNEA
6818

FOLHETO COLETÂNEA 6818

CURSO PÚBLICO 2002

Venha fazer parte da UFSM



BC
E08993

U F S M
Biblioteca Central

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

CARGO

MÉDICO/ OTORRINOLARINGOLOGIA

E08993

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAD **COPERVES**
UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Médico/ Otorrinolaringologia

01. Considerando as afirmações relativas ao angiofibroma nasofaríngeo:

- I. Ocorre exclusivamente no sexo masculino.
- II. É tumor histologicamente maligno e, freqüentemente, causa epistaxe.
- III. Pode ser causa de epistaxe e rinolalia fechada.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas II e III.
- e) apenas I e III.

e) apenas I e III.

02. Considerando as afirmações relativas à disfagia:

- I. Pode ser causada por corpo estranho, queimaduras cáusticas e estenose esofágica.
- II. Pode ser causada por luxação da coluna cervical, anemia ferropriva (Síndrome de Plummer-Vinson) e divertículo esofágico.
- III. Pode ser causada por bocio mergulhante, epiglote aguda e trauma laríngeo com fratura.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas II e III.
- d) I, II e III.
- e) apenas III.

d) I, II e III.

chamada:
cod barras:
local:
inclusão:
n controle:

FOLHETO COLETANEA 68
E08993
BC
8/10/2008
00036778

03. Considerando as afirmações relativas à traqueostomia, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () Está indicada em casos de obstrução das vias aéreas superiores como estenose, fraturas e corpo estranho laríngeos.
- () Diminui o espaço morto e deve ser realizada no 1º anel traqueal, para evitar estenose pós-cirúrgica.
- () São complicações: enfisema subcutâneo, descanulação e hemorragias.

A seqüência correta é

- a) V - F - F.
- b) F - V - F.
- c) F - F - V.
- d) V - V - F.
- e) V - F - V.

04. A laringomalácia

- a) causa estridor expiratório.
- b) é causada pela deficiência nutricional do lactente.
- c) é causa de choro fraco e rouco.
- d) é tratada com epiglottexia, na maioria dos casos.
- e) desaparece com o crescimento do lactente, na maioria dos casos.

05. O desvio de septo nasal

- a) deve ser corrigido cirurgicamente em todos os casos, independente de sintomatologia.
- b) causa obstrução nasal que, geralmente, inicia na adolescência.
- c) quase sempre está associado à presença de pólipos nasais.
- d) não deve ser corrigido cirurgicamente, antes dos 18 anos de idade, em hipótese alguma.
- e) deve ter correção cirúrgica realizada em conjunto com a turbinectomia parcial, inferior, do lado oposto ao desvio.

06. O neurinoma do nervo acústico

- a) raramente causa alterações na audiometria de tronco cerebral.
- b) pode apresentar-se com qualquer tipo de audiometria.
- c) causa crises de vertigem, na maioria dos casos.
- d) raramente apresenta recrutamento.
- e) causa surdez bilateral progressiva, na maioria dos casos.

07. A otosclerose

- a) causa perda auditiva de transmissão, na maioria dos casos.
- b) causa surdez unilateral progressiva, na maioria dos casos.
- c) muito raramente tem caráter familiar.
- d) raramente é melhorada com o uso de prótese auditiva.
- e) pode ser tratada com fluoreto de cálcio combinado com vitamina D, como uma forma de reduzir a progressão da lesão da orelha interna.

08. Considerando as afirmações relativas ao implante coclear:

- I. Os melhores resultados são obtidos com os implantes de tecnologia multicanal em adultos com surdez pós-lingual.
- II. Na criança (menor de 4 anos de idade) que apresenta surdez congênita profunda, a indicação do implante ainda não está bem definida, uma vez que os resultados preliminares de pesquisas recentes mostram-se pouco animadores.
- III. Os casos de surdez infantil, causados por meningite, podem criar dificuldades para a realização do implante, pela ossificação da cóclea, o que ocorre freqüentemente.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas III.
- e) I, II e III.

Na criança menor de 4 anos de idade

09. Considerando as afirmações sobre o colesteatoma:

- I. Na forma congênita, costuma apresentar-se atrás de membrana timpânica íntegra.
- II. Na forma adquirida primária, costuma formar-se a partir de perfuração marginal da pars tensa que segue uma otite média necrosante.
- III. Na forma adquirida secundária, costuma formar-se a partir da invaginação da pars flácida, em direção à orelha média.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas III.
- d) apenas I.
- e) I, II e III.

Na forma adquirida primária o colesteatoma:

10. Considerando as afirmações relativas à otite média aguda necrosante, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () Costuma instalar-se no decurso de sarampo ou escarlatina.
- () O germe causal mais freqüente é o estreptococo beta-hemolítico.
- () Costuma deixar como seqüela ampla perfuração timpânica.

A seqüência correta é

- a) V - F - F.
- b) V - V - F.
- c) F - V - F.
- d) F - F - V.
- e) V - V - V.

11. Considerando as afirmações sobre surdez auto-imune:

- I. Deve ser lembrada sempre que ocorrer perda auditiva bilateral, assimétrica, rapidamente progressiva.
- II. Pode ocorrer sob a forma de surdez súbita.
- III. Pode ocorrer como parte de um quadro sistêmico, como na Síndrome de Coogan.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas II.
- d) apenas III.
- e) I, II e III.

12. Considerando as afirmações relativas à presbiacusia, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () A de tipo neural apresenta comprometimento proporcional dos limiares tonais e do índice de reconhecimento da fala.
- () A do tipo sensorial apresenta perda tonal abrupta para as freqüências acima de 2000 Hz.
- () A do tipo de estria apresenta um índice de reconhecimento de fala muito ruim e desproporcional à queda dos limiares tonais.

A seqüência correta é

- a) V - F - F.
- b) F - V - F.
- c) V - V - F.
- d) F - F - V.
- e) V - V - V.

13. Considerando as afirmações:

- I. Nódulos de pregas vocais são causados pelo mau uso ou abuso da voz e, na maioria das vezes, são bilaterais.
- II. Os pólipos das pregas vocais são decorrentes de laringites e, na maioria dos casos, são unilaterais.
- III. Fonoterapia é curativa, de forma exclusiva, na maioria dos casos de nódulos e pólipos.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I e II.
- e) I, II e III.

14. Considerando as afirmações sobre tromboflebite do seio cavernoso, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () Apresenta exoftalmia, equimose conjuntival e edema das pálpebras, como outras complicações orbitárias das sinusites.
- () Apresenta paralisia dos nervos oculomotores e perda da visão por lesão do nervo óptico.
- () O tratamento com antibióticos e anticoagulantes é o mais indicado.

A seqüência correta é

- a) F - V - F.
- b) V - F - F.
- c) F - V - V.
- d) V - V - V.
- e) F - F - V.

15. Considerando as afirmações:

- I. A discinesia ciliar da mucosa nasossinusal acompanha, em cerca de 50% dos casos, a Síndrome de Kartagener.
- II. A doença fibrocística do pâncreas é acompanhada de rinossinusite crônica de difícil tratamento.
- III. O teste de suor confirma o diagnóstico da Síndrome de Kartagener.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I.
- d) apenas II.
- e) apenas III.

16. Considerando as afirmações relativas a testes com diapasão, em hipoacusia de transmissão da orelha direita e normalidade da orelha esquerda:

- I. O teste de Rinne é negativo na orelha direita e positivo, na esquerda. O teste de Weber lateraliza para a orelha direita.
- II. O teste de Rinne é positivo à esquerda e também à direita. O teste de Weber lateraliza para a esquerda.
- III. O teste de Rinne é negativo à direita e positivo à esquerda. O teste de Weber lateraliza para a esquerda.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas III.
- b) apenas I.
- c) apenas II.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

a) apenas

17. Considerando as afirmações relativas às otoemissões acústicas, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas:

- () São geradas pela movimentação ativa das células ciliadas internas.
- () A maior aplicação clínica de sua pesquisa refere-se à triagem auditiva neonatal.
- () Podem ser obtidas apenas em resposta a clicks.

A seqüência correta é

- a) F - F - V.
- b) V - F - F.
- c) F - V - F.
- d) V - V - F.
- e) F - V - V.

18. Considerando as afirmações:

- I. Nistagmo espontâneo, tipo periférico, é horizonto-rotatório, não muda de sentido com mudança da direção do olhar.
- II. Nistagmo espontâneo, tipo periférico, horizonto-rotatório, desacompanhado de vertigem e alterações neurovegetativas, mas acompanhado de desequilíbrio, pode indicar lesão do sistema nervoso central.
- III. Nistagmo espontâneo, tipo periférico, diminui de intensidade com o fechamento dos olhos.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) apenas III.

19. Considerando as afirmações relativas ao neurinoma do nervo acústico, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas:

- () Forma-se a partir do nervo vestibular inferior, em geral.
- () Vertigem é o sintoma mais frequente.
- () Deve ser suspeitado nos casos de hipoacusia neurosensorial unilateral progressiva.

A seqüência correta é

- a) V - V - V.
- b) F - F - V.
- c) V - V - F.
- d) F - V - F.
- e) V - F - V.

20. Considerando as afirmações referentes às neoplasias malignas da laringe, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas:

- () Neoplasia de prega vocal ocasiona metástases tardias e disfonia precoce.
- () Neoplasia supraglótica ocasiona metástases precoces e dispneia tardia.
- () Neoplasia do seio piriforme ocasiona disfonia precoce e disfagia tardia.

A seqüência correta é

- a) V - V - F.
- b) V - F - F.
- c) V - F - V.
- d) F - V - F.
- e) F - F - V.

21 Considerando as afirmações relativas às fraturas do rochedo do osso temporal:

- I. Na fratura longitudinal, raramente ocorre vertigem.
- II. Paralisia facial ocorre em cerca de 50% dos casos de fratura transversa.
- III. A liquorréia é pouco frequente na fratura longitudinal.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
 - b) apenas II.
 - c) I, II e III.
- d) apenas II e III.
- e) apenas III.

22. Considerando as afirmações relativas às fendas glóticas, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () V A fenda em ampulheta está, freqüentemente, associada a nódulos vocais.
- () F A fenda triangular médio-posterior é característica da disfonia do mal de Parkison.
- () F A fenda fusiforme ântero-posterior está, freqüentemente, associada à formação de pólipos das pregas vocais.

A seqüência correta é

- a) V - F - F.
 - b) F - V - F.
 - c) F - V - V.
 - d) V - V - V.
- e) V - F - V.

23. Considerando as afirmações:

- I. Crianças com laringomalácia têm sua dispnéia diminuída quando colocadas em decúbito ventral.
- II. A epiglote aguda é causada, na maioria das vezes, pelo *Hemophilus influenzae*.
- III. São sintomas e sinais de obstrução laringica: dispneia inspiratória, estridor, tiragem e disfonia.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e II.
- b) I, II e III.
- c) apenas III.
- d) apenas II.
- e) apenas I e III.

24. A doença de Ménière caracteriza-se por apresentar tipicamente:

- a) Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos sons graves, recrutamento, potencial de somação aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, alterado.
- b) Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos sons agudos, recrutamento, potencial de somação aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, normal.
- c) Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos sons graves, sem recrutamento, potencial de somação aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, alterado.
- d) Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos sons graves, recrutamento, potencial de somação aumentado na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, normal.
- e) Hipoacusia neurosensorial com queda predominante nos sons graves, recrutamento, potencial de somação normal na eletrococleografia e B.E.R.A. qualitativamente, normal.

25. Considerando as afirmações:

- I. A Síndrome de Treacher-Collins caracteriza-se por microtia, atresia meatal aural, hipoplasia malar e mandibular.
- II. A Síndrome de Waardenburg caracteriza-se por iris heterocromática, mecha branca nos cabelos e perda auditiva em porcentagem variável dos casos.
- III. A Síndrome de Usher caracteriza-se por bocio congênito e hipoacusia neurosensorial profunda.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
 - b) apenas II.
 - c) apenas I e II.
 - d) apenas III.
- e) I, II e III.

26. A Síndrome de Pierre Robin é constituída por

- a) Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e hipoacusia de condução congênita.
- b) Micrognatia, glossoptose e fenda palatina.
- c) Micrognatia e glossoptose.
- d) Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e hipoacusia de percepção.
- e) Micrognatia, glossoptose, fenda palatina e malformação da orelha externa.

27. Considerando as afirmativas:

- I. O seio maxilar tem seu *ostium* no meato médio.
- II. O seio esfenoidal tem seu *ostium* no meato superior.
- III. O seio frontal tem seu *ostium* no meato médio.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
 - b) apenas II.
 - c) apenas I e III.
 - d) apenas III.
- I, II e III.

28. Considerando as afirmativas referentes ao abcesso peritonsilar (periamigdaliano), assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () O tratamento é feito, exclusivamente, através de antibióticos.
- () A ocorrência de bactérias anaeróbicas é mais freqüente do que nas tonsilites agudas, sem abcesso.
- () A amigdalectomia é sempre indicada.

A seqüência correta é

- F - V - V.
 V - F - F.
 V - F - V.
 F - V - F.
 V - V - V.

1

0

29. Considerando as afirmações relativas ao tratamento cirúrgico da liquorréia por fratura do osso temporal:

- I. Está indicado o tratamento cirúrgico quando ocorrer meningite recorrente.
- II. Está indicado o tratamento cirúrgico quando ocorrer pneumoencéfalo persistente.
- III. Está indicado o tratamento cirúrgico após falência do tratamento conservador que incluiu drenagem lombar.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- I, II e III.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II.
- e) apenas III.

30. Considerando as afirmações relativas à inserção de tubo de ventilação de orelha média, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () A inserção está indicada na otite média crônica, com efusão, presente por mais de três meses.
- () A inserção está indicada em casos de otite média aguda recorrente (acima de três episódios em seis meses ou quatro episódios em doze meses).
- () A inserção está indicada sempre que for feita paracentese da membrana timpânica, nos casos de otite média aguda.

A seqüência correta é

- a) V - V - F.
 V - V - V.
 V - F - F.
 F - V - F.
 F - F - V.

31. Considerando as afirmações relativas à atresia aural congênita unilateral, pode-se afirmar:

- I. Em 90% dos casos, causa hipoacusia de condução, exclusivamente.
- II. O uso de prótese auditiva por via óssea está sempre indicado.
- III. O tratamento cirúrgico nem sempre está indicado.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas II.
- d) apenas III.

- apenas I e III.

32. Considerando as afirmações:

- I. Colesteatoma congênito pode ocorrer na orelha média, no ápice petroso do temporal e no ângulo ponto cerebelar.
- II. Colesteatoma adquirido primário é consequência de bolsa de retração da membrana timpanica.
- III. Colesteatoma adquirido secundário é consequência de descamação epitelial da margem de uma perfuração da membrana timpanica.

Está(ão) correta(s)

I, II e III.

b) apenas I.

c) apenas I e II.

d) apenas II.

e) apenas III.

II. Colesteatoma adquirido primário é consequência de bolsa de retração da membrana timpanica.

33. São músculos abdutores das pregas vocais:

- a) Músculos cricoaritenoides laterais.
- b) Músculos cricotireoideos.
- c) Músculos cricotireoideos e cricoaritenoides laterais.
 d) Músculos cricoaritenoides posteriores.- e) Músculos tiroaritenoides.

33. Série

34. Considerando as afirmações referentes à otite externa maligna, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () Ocorrência predominante em diabéticos insulino-dependentes e imunodeprimidos.
- () A etiologia mais freqüente é o pseudomonas aeruginosa.
- () Clindamicina é a droga de eleição no tratamento.

A seqüência correta é

a) F - F - V.

b) V - F - V.

c) F - V - F.

d) V - F - F.

e) V - V - F.
Considerando as afirmações referentes à otite externa maligna, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma

35. A perilinfa

- a) é formada na estria vascular.
- b) tem alta concentração de potássio.
 c) é reabsorvida no saco endolinfático.- d) tem baixa concentração de sódio.
- e) é formada a partir do liquor cefalorraquidiano.

36. A curvatura de Passavant é formada

- a) pelas fibras do músculo tensor do palato.
- b) pelas fibras interdigitantes do músculo constrictor superior da faringe.
 c) pelos pilares posteriores.- d) pelo palato mole e músculo constrictor superior da faringe.
 e) pelos pilares posteriores, palato mole e músculo constrictor superior da faringe.

37. A pirâmide nasal e o septo nasal são constituídos por

- a) ossos próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior, vómer, cartilagem quadrangular e lámina perpendicular do etmóide.
- b) ossos próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior, cartilagem quadrangular e lámina perpendicular do etmóide.
- c) ossos próprios, cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior, vómer e cartilagem quadrangular.
- d) ossos próprios, cartilagem lateral superior, vómer, cartilagem quadrangular e lámina perpendicular do etmóide.
- e) cartilagem lateral superior, cartilagem lateral inferior, vómer, cartilagem quadrangular e lámina perpendicular do etmóide.

38. Considerando as afirmações referentes à etiologia das epistaxes, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma delas.

- () Distúrbios locais como traumatismo, infecção, corpo estranho, procedimentos cirúrgicos nasais.
() Neoplasias malignas, angiofibroma juvenil.
() Distúrbios hematológicos: leucemia, hemofilia, hipovitaminose K, uso de aspirina e warfarina.

A seqüência correta é

- a) V - V - V.
b) V - V - F.
c) V - F - V.
d) F - V - F.
e) F - F - V.

39. As conexões nervosas centrais do aparelho vestibular são:

- a) Núcleos vestibulares, núcleo do nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talâmico, trato cerebelar.
b) Núcleos vestibulares, núcleo do nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, trato cerebelar e núcleos oculomotores.
 c) Núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, núcleo do nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talâmico, trato cerebelar.
d) Núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talâmico, trato cerebelar.
e) Núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, núcleo do nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talâmico, trato cerebelar, complexo olivar superior.

40. Considerando as afirmações:

- I. As células ciliadas externas são em maior número do que as internas, têm contato permanente com a membrana tectoria e não enviam informações para o córtex auditivo.
 b) Núcleos vestibulares, núcleo do nervo vago, feixe vestíbulo-espinal, feixe vestíbulo-talâmico, trato cerebelar.
II. As células ciliadas internas são em maior número do que as externas e têm contato permanente com a membrana tectoria.
III. As células ciliadas internas e externas são menores na base do que no ápice da cóclea.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas I e III.
d) apenas I e II.
e) apenas II e III.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONCURSO PÚBLICO 2002

Venha fazer parte da UFSM

Medicamento para o dia-a-dia			
01	E	21	C
02	D	22	A
03	E	23	B
04	E	24	D
05	B	25	C
06	D	26	B
07	A	27	C
08	C	28	A
09	D	29	B
10	E	30	A
11	E	31	E
12	B	32	A
13	D	33	D
14	D	34	E
15	A	35	E
16	B	36	B
17	C	37	A
18	B	38	A
19	E	39	C
20	A	40	C