

FOLHETO  
COLETÂNEA  
6823



BC  
E09003

FOLHETO COLETÂNEA 6823

# CURSO PÚBLICO 2002

*Venha fazer parte da UFSM*

**UFSM**  
Biblioteca Central

Biblioteca Central  
Coletânea UFSM

Nº INSCRIÇÃO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

NOME DO CANDIDATO

|  |
|--|
|  |
|--|

CARGO

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

|  |
|--|
|  |
|--|

E09003

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPERVES**  
UFSM

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

Leia o texto a seguir para responder às questões de Língua Portuguesa.



**Correio**

Você pergunta

saude.abril@atleitor.com.br

MEDICINA

► O silicone colocado nos seios pode atrapalhar a visualização de um câncer de mama?

Maria Rodrigues, Fortaleza, CE

O assunto ainda causa muita controvérsia. "Dependendo da forma como a prótese é colocada, ela é capaz, sim, de comprometer o resultado da mamografia", alerta o mastologista Cláudio Kemp, da Universidade Federal de São Paulo (veja infográfico ao lado). Existe, porém, quem acredite que o problema é coisa do passado: "Existem técnicas mais avançadas, como a ressonância magnética, que permitem visualizar o tumor

Estima-se que mais de 2 milhões de próteses de silicone tenham sido implantadas no mundo desde que a técnica foi criada, há quase 40 anos

mesmo com o silicone", defende o cirurgião plástico Rogério Camargo Scheibe, de Curitiba. Mas quem inclui a ressonância na rotina de exames de prevenção desses tumores? Até que se prove o contrário, mulheres com implantes devem se cuidar mais.


## VAIDADE PERIGOSA

Como o implante pode atrapalhar o resultado da mamografia

1 Neste exemplo, o silicone é colocado na parte superior do seio, em cima das glândulas mamárias.

2 Se o nódulo surge embaixo da prótese, ele pode passar despercebido pelo raio-X.

3 No resultado do exame, a prótese — a parte opaca vista na figura ao lado — pode encobrir até 80% da mama.



Saúde! é vital, setembro de 2001.

01. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das alternativas relacionadas ao emprego de palavras ou expressões do texto.

- ( ) O verbo "defende", usado pelo redator, confirma o posicionamento do cirurgião plástico Rogério Camargo Scheibe.
- ( ) O emprego do conetivo "Mas", na introdução do questionamento, deu ênfase ao alerta feito pelo redator.
- ( ) Segundo o mastologista Cláudio Kemp, a prótese compromete o resultado da mamografia.

A sequência correta é

- a) F - V - F.
- b) F - F - V.
- c) V - F - F.
- d) V - V - F.
- e) V - F - V.

02. No segmento "O assunto ainda causa muita controvérsia", a alternativa que apresenta sentido OPOSTO à palavra sublinhada é

- a) discussão.
- b) polêmica.
- c) disputa.
- d) divergência.
- e) consonância.

chamada:  
cod barras:  
local:  
inclusão:  
n controle:

FOLHETO COLETANEA 68 °  
E09003  
BC  
8/10/2008  
00036784

03. Analise

- I. Cada p...  
mesma...  
nódulo...  
contro...  
há - é
  - II. As pal...  
mesmo
  - III. De "sili...  
da sílaba
- Está (ão)
- a) apenas
  - b) apenas
  - c) apenas
  - d) apenas
  - e) I, II e III

Observe

"Existe...  
magnético

"Existe...  
passado

"Até qu...  
4

04. Ana...  
é correto

- a) 1 e 3
- b) 3 e 4
- c) 2 e 4
- d) 4 e 5
- e) 1 e 5

**03. Analise as afirmações:**

- I. Cada par de palavras a seguir está unido segundo a mesma regra de acentuação:  
nódulo - prótese  
controversia - ressonância  
há - é
- II. As palavras "mamografia" e "implantadas" possuem o mesmo número de sílabas.
- III. De "silicone" para *siliconada*, ocorre mudança na posição da sílaba tônica.

Está (ão) correta(s)

- a) apenas I.  
b) apenas I e II.  
c) apenas II.  
d) apenas III.  
e) I, II e III.

Observe os fragmentos:

"Existem técnicas mais avançadas, como a ressonância magnética, que permitem visualizar o tumor..."

"Existe, porém, <sup>1</sup>quem <sup>2</sup>acredite <sup>3</sup>que o problema é coisa do passado..."

"Até <sup>4</sup>que se prove o contrário..."

**04. Analisando as palavras identificadas através de números, é correto afirmar que**

- a) 1 e 3 pertencem à mesma classe.  
b) 3 é um pronome relativo.  
c) 2 e 4 pertencem à mesma classe.  
d) 4 é um pronome demonstrativo.  
e) 1 é um pronome relativo.

Observe os fragmentos:

"Se o nódulo surge embaixo da prótese..."

"(...) tenham sido implantadas no mundo desde que a técnica foi criada, há quase 40 anos."

**05. Os segmentos sublinhados assumem, no contexto, respectivamente, o valor de**

- a) temporalidade - sequência.  
b) finalidade - consequência.  
c) condição - temporalidade.  
d) conformidade - concessão.  
e) oposição - consequência.

Observe as formas verbais utilizadas no fragmento.

"Existem técnicas mais avançadas, (...), que permitem visualizar o tumor..."

**06. Considerando as alterações propostas, complete corretamente as lacunas.**

\_\_\_\_\_ técnicas mais avançadas que \_\_\_\_\_ visualizar o tumor.

- a) Houveram - permitiram  
b) Haveriam - permitissem  
c) Haverá - permitirão  
d) Haverão - permitirão  
e) Haverá - permitiram

**07. Analise as afirmações a respeito da pontuação, concordância e regência do segmento destacado.**

"Existem técnicas mais avançadas, como a ressonância magnética, que permitem visualizar o tumor mesmo com o silicone..."

- I. As vírgulas foram usadas para separar um aposto.  
II. O verbo "permitem" concorda com o sujeito "que".  
III. Se o termo "visualizar" fosse substituído por visualização, sendo feitas as alterações necessárias, ocorreria um caso de crase.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.  
b) apenas I e II.  
c) apenas II.  
d) apenas III.  
e) I, II e III.

08. Relacione as colunas, considerando a regência dos verbos sublinhados nos segmentos.

1. Verbo intransitivo
2. Verbo transitivo direto
3. Verbo transitivo indireto
4. Verbo de ligação

- ( ) "Mas quem inclui a ressonância na rotina de exames...?"
- ( ) "(...) mulheres com implantes devem se cuidar mais."
- ( ) "(...) ela é capaz, sim, de comprometer o resultado da mamografia."
- ( ) "Se o nódulo surge embaixo da prótese..."

A sequência correta é

- a) 1 - 2 - 3 - 4.
- b) 2 - 3 - 4 - 1.
- c) 3 - 2 - 1 - 4.
- d) 2 - 4 - 3 - 1.
- e) 3 - 2 - 4 - 1.

Observe as frases:

Existem próteses de \_\_\_\_\_ gramas.

É preciso que a mulher \_\_\_\_\_ faça o exame das mamas.

Caso haja um nódulo, a mulher \_\_\_\_\_ detectará através do toque.

09. Selecione a alternativa que apresenta as palavras adequadas para o preenchimento das lacunas.

- a) duzentos - mesma - o
- b) duzentas - mesma - lhe
- c) duzentos - mesmo - o
- d) duzentas - mesmo - lhe
- e) duzentas - mesmo - o

10. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas propostas.

- ( ) Se o numeral "40" estivesse sendo empregado após o substantivo, para designar decretos ou artigos, deveria ser representado pelo seu correspondente ordinal.
- ( ) Se a medida (grama) adotada para quantificar o silicone empregado nas próteses for expressa em símbolo, a forma correta será g .
- ( ) Se ao formular o seu questionamento a leitora tivesse optado por um tratamento formal, teria usado Vossa Senhoria e o verbo correspondente seria empregado na 3ª pessoa.

A sequência correta é

- a) F - F - V.
- b) V - F - F.
- c) F - V - F.
- d) F - V - V.
- e) V - F - V.

11. Assinale a alternativa que considera a seguinte frase incorreta: "A radiografia do tórax foi feita no dia 10 de março de 2002."

- a) O filio do tórax.
- b) A em de março.
- c) A fixação do tórax.
- d) Não foi feita a radiografia.
- e) A radiografia do tórax.

12. O verbo "dar" é usado incorretamente em:

- a) dar a palavra.
- b) dar a mão.
- c) deixar a palavra.
- d) deixar a mão.
- e) escutar a palavra.

13. Assinale a alternativa que reduz a expressão "exame de imagem" a uma única palavra.

- a) Kilo.
- b) Kilo.
- c) Uso.
- d) Uso.
- e) Aumento.

14. Assinale a alternativa que apresenta a máxima correta.

- a) 2x
- b) 5x
- c) 7x
- d) 10x
- e) 50x

# Técnico em Radiologia

11. Assinale a alternativa que contém a resposta correta, considerando o processo de REVELAÇÃO de uma chapa radiográfica.

- a) O filme ficará mais transparente onde não houve incidência dos raios.
- b) A emulsão com prata adere à película nos locais que não receberam Raios X.
- c) A fixação da emulsão se dá onde não ocorreu incidência de raios.
- d) Não há qualquer fixação de prata durante o processo de revelação.
- e) A revelação é exclusivamente fenômeno físico.

12. O ÉCRAN é usado para

- a) dar mais colorido à radiografia.
- b) dar mais intensidade à imagem radiografada.
- c) deixar o paciente mais tempo exposto aos Raios X.
- d) deixar o paciente menos tempo exposto aos Raios X.
- e) escurecer mais a imagem.

13. Assinale a alternativa que apresenta os fatores que reduzem a exposição do paciente aos Raios X durante um exame.

- a) Kilovoltagem alta e Miliamperagem alta.
- b) Kilovoltagem baixa e Miliamperagem baixa.
- c) Uso de filtros e de filmes rápidos.
- d) Uso de filtros e de grade anti-difusora.
- e) Aumento da distância foco-filme e uso de grade anti-difusora.

14. A quem trabalha com Raios X, são permitidas doses máximas anuais de

- a) 2x mais do que o público.
- b) 5x mais do que o público.
- c) 7x mais do que o público.
- d) 10x mais do que o público.
- e) 50x mais do que o público.

15. Quanto às definições dos termos radiografia x filme fotográfico, pode-se afirmar que

- a) um filme de Raios X pode ser definido como uma radiografia que contém uma imagem processada.
- b) uma radiografia pode ser definida como um filme de Raios X, contendo uma imagem processada.
- c) filme radiográfico e radiografia são termos sinônimos.
- d) o termo radiografia refere-se apenas à imagem contida no filme radiográfico.
- e) a radiografia refere-se, especificamente, ao pedaço físico de material utilizado na execução do exame.

16. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) O termo médio sagital divide o corpo em duas metades, uma anterior e outra posterior.
- ( ) O termo incidência define a direção do feixe de Raios X.
- ( ) Uma incidência pósterio-anterior indica que a região anterior está mais próxima do tubo de Raios X.
- ( ) O termo abdução significa afastamento de um membro em relação ao corpo.
- ( ) O termo valgo descreve uma deformidade em direção oposta à linha média.
- ( ) Na posição oblíqua posterior, só é possível executar incidências radiográficas ântero-posteriores.

A sequência correta é

- a) F - V - V - V - V - F.
- b) F - V - F - F - V - F.
- c) V - F - V - F - V - V.
- d) F - V - F - V - F - V.
- e) V - F - F - V - F - V.

17. Suponha que ao revelar uma radiografia, você perceba que a mesma está com boa densidade, porém, pobre em contraste. A conduta correta para corrigi-la é

- a) aumentar o Kv e diminuir o mAs, para compensar a densidade.
- b) diminuir o Kv e aumentar o mAs, para compensar a densidade.
- c) diminuir o Kv para melhorar o contraste e manter o mAs, já que a densidade está boa.
- d) aumentar o mAs para melhorar o contraste e manter o Kv, já que a densidade está boa.
- e) aumentar o Kv e o mAs.

18. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Miliamperagem          | ( ) Grau de escurecimento da radiografia                           |
| 2. Densidade              | ( ) Fator de controle primário para o contraste radiográfico       |
| 3. Kilovoltagem           | ( ) Está relacionado (a) à quantidade de Raios X emitida pelo tubo |
| 4. Contraste              | ( ) Diferença entre as densidades de imagem radiografada           |
| 5. Detalhe                | ( ) Interfere na distorção da imagem                               |
| 6. Distância foco-filme   | ( ) Nitidez de uma radiografia                                     |
| 7. Distância objeto-filme | ( ) Interfere na densidade radiográfica                            |

A sequência correta é

- a) 1 - 3 - 2 - 4 - 7 - 5 - 6.
- b) 4 - 3 - 1 - 2 - 5 - 7 - 6.
- c) 2 - 1 - 3 - 4 - 7 - 6 - 5.
- d) 3 - 2 - 7 - 5 - 4 - 6 - 1.
- e) 2 - 3 - 1 - 4 - 7 - 5 - 6.

19. Os principais fatores de controle que devem ser ajustados para que a distorção da imagem radiográfica seja mínima, são

- a) alinhamento do raio central, kilovoltagem, miliamperagem e tempo de exposição.
- b) kilovoltagem, miliamperagem, tempo de exposição e distância foco-filme.
- c) distância objeto-filme, alinhamento do raio central, alinhamento objeto-filme e distância foco-filme.
- d) alinhamento objeto-filme, alinhamento do raio central, tempo de exposição e miliamperagem.
- e) tempo de exposição, tamanho do ponto focal e distância foco-filme.

20. Assinale a alternativa que apresenta os fatores que diferenciam a incidência lateral de face, da incidência lateral do osso nasal.

- a) Densidade, ângulo do raio central e tamanho do campo irradiado
- b) Contraste, ponto de entrada do raio central e tamanho do campo irradiado
- c) Tamanho do campo irradiado, borrosidade e contraste
- d) Densidade, ponto de entrada do raio central e tamanho do campo irradiado
- e) Distorção, densidade e ângulo do raio central

21. Para o estudo radiológico da sela turca, as incidências mais conhecidas são

- a) Waters - Towne - lateral.
- b) Towne - Hirtz - Caldwell.
- c) PA a 0° - Caldwell - lateral.
- d) lateral - Towne - Haas.
- e) Towne - lateral - Waters modificado.

22. Para a incidência lateral da coluna cervical, é verdadeiro afirmar que

- a) o raio central é centrado em C4-C5, com 15° de inclinação cefálica.
- b) devemos efetuar a exposição no momento em que o paciente realizar inspiração máxima.
- c) a porção superior da coluna fica superposta aos ombros.
- d) o raio central é perpendicular ao filme, centrado em C4-C5.
- e) o paciente deve baixar o queixo, para não sobrepor a mandíbula à coluna.

23. Ao a

- a) aprov
- b) radi
- c) radi
- d) fazer
- e) posi

24. Na i

- a) OSSO f
- b) OSSOS
- c) OSSO O
- d) OSSO f
- e) forame

25. Ao re

- a) paralel
- b) perpen
- c) angula
- d) perpen
- e) angula



**23.** Ao atender a uma solicitação para estudo das duas mãos, o técnico em radiologia deve

- a) aproveitar a mesma exposição e radiografar as duas mãos juntas.
- b) radiografar as mãos juntas, com inclinação proximal do raio central em 5°.
- c) radiografar as mãos juntas, com inclinação distal do raio central.
- d) fazer o eixo longitudinal das duas mãos formar um ângulo de 15° entre si.
- e) posicionar e expor separadamente as mãos para obter um melhor posicionamento do raio central.

**24.** Na incidência de Towne para crânio, as principais estruturas evidenciadas são:

- a) osso frontal - seios frontais - osso esfenóide.
- b) ossos parietais - seios maxilares - osso esfenóide.
- c) osso occipital - pirâmides petrosas - dorso da sela turca.
- d) osso frontal - crista galli - condutos auditivos internos.
- e) forame oval - processos mastóides - seio esfenoidal.

**25.** Ao realizar uma incidência em AP do joelho, o técnico deve posicionar o raio central de forma que fique

- a) paralelo ao platô tibial, incidindo 2 cm distal à patela.
- b) perpendicular ao platô tibial, incidindo na borda distal da patela.
- c) angulado em 5° cefálico, incidindo no meio da patela.
- d) perpendicular ao filme, incidindo na borda proximal da patela.
- e) angulado caudalmente em 5°, incidindo na borda distal da patela.

**26.** Em um paciente que dá entrada no pronto-socorro com trauma torácico e suspeita de pneumotórax, o estudo radiológico do tórax deve ser realizado, preferencialmente, em

- a) ortostase com inspiração profunda.
- b) decúbito ventral com inspiração profunda.
- c) ortostase com apnéia expiratória.
- d) decúbito dorsal sem apnéia.
- e) decúbito lateral com raio horizontal.

**27.** Na execução da incidência de Neer, para o estudo do ombro esquerdo, é verdadeiro afirmar:

- a) O paciente fica na posição O.P.E. e o raio central é angulado caudalmente em 10 a 15°.
- b) A escápula fica paralela ao filme e o raio central é perpendicular a esse.
- c) A escápula fica perpendicular ao filme e o raio central é angulado caudalmente em 10 a 15°.
- d) O paciente fica na posição O.P.E. e o raio central é angulado cefalicamente em 10 a 15°.
- e) A escápula fica perpendicular ao filme e o raio central é angulado cefalicamente em 5 a 10°.

**28.** Com relação ao estudo radiológico das mamas (mamografia), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A compressão da mama não interfere no resultado do exame.
- b) As incidências básicas são a crânio-caudal (CC) e oblíqua mediolateral (OML).
- c) Na incidência crânio-caudal bem posicionada, o mamilo é observado em perfil.
- d) Uma incidência oblíqua mediolateral, corretamente posicionada, mostrará o músculo peitoral ao nível do mamilo.
- e) Em pacientes com implante mamário, é utilizada a técnica de Eklund.

29. Assinale a alternativa que apresenta exames em que o técnico deve utilizar acessórios de proteção - avental, óculos, protetor de tireóide.

- a) Raios X de tórax - Raios X do úmero - Raios X da bacia
- b) Esôfago contrastado - arteriografia - enema baritado
- c) Raios X dos seios da face - ossos próprios do nariz - crânio
- d) Raios X do joelho - Raios X dos ossos dos pés - Raios X dos ossos das mãos
- e) Raios X do cotovelo - Raios X do tornozelo - Raios X da coluna

30. Com relação à obtenção de uma vista frontal do esterno, deve-se considerar INCORRETA a seguinte afirmação:

- a) A vista frontal é bem demonstrada numa incidência em PA verdadeira.
- b) A visualização frontal é obtida adequadamente na posição oblíqua anterior direita (OAD).
- c) Uma obliquidade de 15 a 20° do paciente possibilita uma visão frontal adequada.
- d) O grau de obliquidade do paciente depende da profundidade da caixa torácica.
- e) Um paciente com tórax grande requer menor obliquidade.

31. Uma das afirmações é VERDADEIRA para o estudo radiográfico das costelas. Identifique-a.

- a) Para as costelas supra-diafragmáticas, é preferível efetuar a exposição em expiração.
- b) Para uma lesão na região anterior direita, a posição oblíqua de escolha é a anterior esquerda.
- c) Para uma lesão na região anterior esquerda, a posição oblíqua de escolha é a anterior esquerda.
- d) As costelas infra-diafragmáticas exigem uma técnica com maior contraste radiográfico do que as supra-diafragmáticas.
- e) Ao efetuar o posicionamento oblíquo anterior, o paciente deve aproximar do filme, o lado afetado.

32. No estudo radiológico das mãos e punhos para avaliação da idade óssea, que incidência(s) deve(m) ser realizada(s)?

- a) AP de ambas as mãos.
- b) AP e Oblíquo de ambas as mãos.
- c) Somente AP da mão direita.
- d) Somente AP da mão esquerda.
- e) AP e perfil da mão direita.

33. O técnico em radiologia, ao analisar os parâmetros de posicionamento de uma radiografia de fêmur, pode considerar válido o seguinte critério de avaliação:

- a) A superposição das margens distais dos côndilos femorais indicam a posição AP verdadeira.
- b) Para uma incidência em AP correta, o espaço articular deve apresentar-se aberto.
- c) A incidência lateral verdadeira será evidenciada pela simetria dos côndilos femorais.
- d) O paciente foi posicionado corretamente em AP quando a patela está projetada no meio da articulação do joelho.
- e) A superposição das margens articulares anteriores e posteriores dos côndilos femorais indicam a posição lateral verdadeira.

34. Assinale a alternativa que apresenta o indivíduo que NÃO deve atuar com Raio X.

- a) Menores de 21 anos.
- b) Menores de 18 anos.
- c) Maiores de 70 anos.
- d) Mulheres com mais de 50 anos.
- e) Mulheres com menos de 24 anos.

35. Um urografista estômago (C.D.L.)

- a) C.D.
- b) R.EE
- c) R.EE
- d) U.E.
- e) C.D.L

36. ASSIN

- a) A técn
- b) O dos
- c) Se for
- d) O técn
- e) A distâ

37. A difer

- a) o ponto
- b) para o e
- c) para as a
- d) a angula
- e) a angula



35. Um paciente necessita realizar os exames radiológicos: urografia excretora (U.E.), estudo radiológico do esôfago, estômago e duodeno (R.EED) e coluna dorsal e lombar (C.D.L.). Qual deve ser a ordem de execução?

- a) C.D.L. - R.EED - U.E.
- b) R.EED - C.D.L. - U.E.
- c) R.EED - U.E. - C.D.L.
- d) U.E. - R.EED - C.D.L.
- e) C.D.L. - U.E. - R.EED.

36. Assinale a questão INCORRETA.

- a) A técnica grávida deve usar um segundo dosímetro sob o avental - no abdômen.
- b) O dosímetro deve ser usado sempre.
- c) Se for necessário conter o paciente, isso deve ser feito por uma pessoa que não seja o trabalhador do Raio X.
- d) O técnico deve minimizar seu tempo em um campo de exposição.
- e) A distância existente entre o técnico e a fonte de Raios X não interfere no tipo de proteção radiológica.

37. A diferença mais importante no posicionamento do raio central, na efetuação da incidência de articulações sacroilíacas (SI), é que

- a) o ponto de entrada é 3 cm acima, para o estudo do sacro.
- b) para o exame do sacro, o ângulo é caudal e para as articulações SI, é cefálico.
- c) para as articulações SI, a angulação é cefálica e 10 a 15° maior.
- d) a angulação é 10° menor para as articulações SI.
- e) a angulação é cefálica para o sacro e nula, para as articulações SI.

38. Ao realizar uma incidência AP do cotovelo de um paciente que não consegue estendê-lo totalmente, o técnico deve

- a) efetuar duas exposições: uma, com o antebraço paralelo ao filme e outra, com o braço paralelo ao filme.
- b) efetuar uma exposição com o cotovelo em V, com o raio central perpendicular ao filme.
- c) efetuar duas exposições: uma, com angulação proximal do raio central em 5° e outra, com angulação distal do raio central em 5°.
- d) efetuar a exposição com o braço paralelo ao filme e o raio central em 0°.
- e) efetuar a exposição com o antebraço paralelo ao filme e o raio central a 0°.

39. Identifique a afirmação INCORRETA para o estudo radiográfico do abdômen.

- a) A rotina de 3 incidências para o abdômen agudo compõe-se de : AP em decúbito dorsal, AP em ortostase e PA de tórax.
- b) A rotina de 2 incidências para o abdômen agudo compõe-se de AP em decúbito dorsal e AP em ortostase.
- c) A incidência lateral do abdômen é útil na demonstração de massas.
- d) A rotina de 3 incidências para abdômen agudo compõe-se de AP em decúbito dorsal, AP em ortostase e perfil.
- e) A incidência AP com raios horizontais deve ser executada na posição de decúbito lateral esquerdo, para melhor demonstrar eventual presença de ar na cavidade.

40. Assinale a alternativa que contém informação INCORRETA.

- a) Mesmo com história de alergia prévia, o paciente pode realizar uma dacriocistografia.
- b) O paciente deve estar sempre em jejum quando for realizar exame radiológico com contraste endovenoso.
- c) Náusea pode ser um sinal de reação alérgica ao meio de contraste.
- d) Em paciente com insuficiência renal, não deve ser usado meio de contraste iodado.
- e) Paciente com alergia não pode realizar exame contrastado do esôfago ou do intestino grosso.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

**CONCURSO PÚBLICO 2002**

*Venha fazer parte da UFSM*

| TÉCNICO EM RADIOLOGIA |   |    |   |
|-----------------------|---|----|---|
| 01                    | D | 21 | D |
| 02                    | E | 22 | D |
| 03                    | A | 23 | E |
| 04                    | E | 24 | C |
| 05                    | C | 25 | A |
| 06                    | C | 26 | C |
| 07                    | B | 27 | C |
| 08                    | B | 28 | A |
| 09                    | A | 29 | B |
| 10                    | D | 30 | A |
| 11                    | A | 31 | B |
| 12                    | D | 32 | D |
| 13                    | C | 33 | E |
| 14                    | E | 34 | B |
| 15                    | B | 35 | E |
| 16                    | D | 36 | E |
| 17                    | B | 37 | C |
| 18                    | E | 38 | A |
| 19                    | C | 39 | D |
| 20                    | D | 40 | E |

ESTE LIVRO É PATRIMÔNIO CULTURAL  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA  
MARIA. ELE É TERMO D'AMOR DO  
LADO COM QUELHE APOIS VOLTAR  
OPTIMIZANDO A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Biblioteca Central  
UFSM