



Candidato:

Prova Escrita || ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE

09|03|2022

QUESTÃO 01 – Aspiração de corpos estranhos para a via aérea por crianças tem uma ocorrência elevada. Um objeto alojado nas vias aéreas não detectado, provavelmente se manifestará na forma de

- I. Atelectasia.
- II. Sibilância.
- III. Tosse crônica.
- IV. Pneumonia recorrente

Está(ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV

QUESTÃO 02 - Qual das seguintes afirmações é verdadeira com relação às efusões parapneumônicas?

- A) Todos os pacientes com efusão parapneumônica requerem hospitalização..
- B) Todas as efusões parapneumônicas requerem torascopia para resolução.
- C) Todas as efusões parapneumônicas, se cultivadas, serão positivas para patógenos.
- D) Todas as efusões parapneumônicas requerem intervenção cirúrgica.
- E) Pequenas efusões parapneumônicas são geralmente clinicamente irrelevantes e se resolvem sem intervenção cirúrgica.

QUESTÃO 03 - Distúrbios eletrolíticos ligados ao sódio (Na^+) requerem cuidados na sua correção. O prazo ideal para corrigir uma natremia de 155mEq/L , cuja criança apresenta como sintomatologia, apenas irritabilidade é

- A) o mais rápido possível.
- B) 6 horas.
- C) 24 horas.
- D) 72 horas.
- E) 4-5 dias

QUESTÃO 04 – Recém-nascido (RN), 40 semanas de idade gestacional, Apgar 9/10, apresenta icterícia leve em face com 18 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco. Grupo sanguíneo materno: O+, do RN: B+, Coombs direto negativo coletado em sangue do cordão. Exame físico: ativo, mamando bem e eliminações fisiológicas presentes. Nesse caso, a melhor conduta é:

- A) Suspender o aleitamento materno, pois se trata de icterícia associada ao aleitamento materno
- B) Observar clinicamente e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir sobre a realização de exames
- C) Indicar internação em unidade de terapia intensiva neonatal para a realização de exsanguíneotransfusão, por se tratar de incompatibilidade ABO
- D) Dar alta hospitalar e solicitar retorno para avaliação em 48 horas.
- E) Solicitar exames laboratoriais para avaliar incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia.

QUESTÃO 05 – Ao prestar assistência em sala de parto a um recém-nascido a termo, você observa que ao romper a bolsa o líquido amniótico encontra-se meconial. Logo após a extração, o recém-nascido está com tônus preservado, mas com movimentos respiratórios irregulares. A conduta apropriada neste caso após o clampeamento do cordão umbilical é:

- A) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido, promover o contato pele-a-pele com a mãe e aspirar o nariz do recém-nascido nesta posição para facilitar sua respiração.

-
- B) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido e promover o contato pele-a-pele com a mãe, sempre friccionando a sua pele para que ele respire normalmente.
 - C) Levar o recém-nascido para berço de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar boca e nariz, secar, desprezar campos e avaliar.
 - D) Levar o recém-nascido para berço de calor radiante, posicionar a cabeça e aspirar a traqueia, mediante laringoscopia.
 - E) Observar a evolução durante 30 minutos.

QUESTÃO 06 – Quais das drogas antiepiléticas abaixo são consideradas terapias de primeira e segunda linhas para convulsões neonatais?

- A) Diazepam e Fenobarbital.
- B) Fenobarbital e Fenitoína.
- C) Fenitoína e Midazolam.
- D) Fenobarbital e Lorazepam.
- E) Fenobarbital e Ácido valpróico.

QUESTÃO 07 – Uma mulher de 20 anos, após passar alguns dias de férias na praia, apresenta lesão cutânea pruriginosa no dorso do pé direito, caracterizada como um cordão eritematoso decerca de 4 mm de largura, elevado, com trajeto sinuoso, estendendo-se até o tornozelo. O tratamento de escolha é

- A) cetoconazol.
- B) prednisona.
- C) metronidazol.
- D) furazolidona.
- E) tiabendazol.

QUESTÃO 08 – Uma mulher de 30 anos procura o médico com resultado de exame de sangue positivo para anti-HCV, constatado em doação de sangue. Ela não apresenta fatores de risco para hepatite C e o resultado foi confirmado em outro laboratório. Dentre as abaixo, a conduta mais adequada será

- A) solicitar transaminases, se normais, acompanhar com dosagens periódicas dessas enzimas.
- B) indicar biópsia hepática.
- C) indicar biópsia hepática se houver aumento de transaminases.
- D) tranquilizar paciente, visto que em mulheres a hepatite C tem risco de cronificação quase nulo.
- E) solicitar pesquisa de RNA do vírus C.

QUESTÃO 09 – Homem de 45 anos, diabético há 7 anos em acompanhamento irregular, vem à consulta assintomático, com PA de 140/90 mmHg, e trazendo os seguintes exames: hemoglobina glicada de 8,2%, creatinina de 1,2 mg/dL e microalbuminúria de 100 mg/24 horas. O médico que o atende, na tentativa de prevenir o surgimento de insuficiência renal, deve preconizar as seguintes medidas, EXCETO

- A) prescrever inibidor da ECA.
- B) evitar exames que utilizem contraste iodado.
- C) dieta hiperproteica.
- D) manter hemoglobina glicosilada inferior a 7%.
- E) manter pressão arterial inferior a 130/80 mmHg.

QUESTÃO 10 – Um homem de 25 anos com diarreia, flatulência e meteorismo há 9 meses apresenta anticorpos antiendomíseo e antitransglutaminase tissular positivos. Ele mais provavelmente se beneficiará de

- A) dieta sem glúten.

- B) enemas de corticoesteróide.
- C) metronidazol oral por tempo prolongado.
- D) infliximabe.
- E) corticoesteróide sistêmico.

QUESTÃO 11 – A síndrome do QT longo predispõe ao aparecimento de

- A) *torsades de pointes*.
- B) *flutter* atrial.
- C) BAV total.
- D) taquicardia paroxística supraventricular.
- E) fibrilação atrial

QUESTÃO 12 – Na anemia da doença crônica espera-se encontrar os achados abaixo, EXCETO

- A) estoque de ferro na medula normal ou aumentado.
- B) inabilidade da medula em aumentar a eritropoiese em resposta à anemia.
- C) transferrina sérica e saturação de transferrina elevadas.
- D) eritropoietinaelevada, porém em níveisabaixodoqueseriade seesperarpara onívelde anemia.
- E) hipoferremia.

QUESTÃO 13 – Ingestão de oocistos provenientes do solo, ingestão de carne crua e infecção transplacentária são os modos de transmissão de

- A) cisticercose.
- B) histoplasmose.
- C) criptococose.
- D) toxoplasmose.
- E) strongiloidíase.

QUESTÃO 14 – Em um adulto jovem com quadro de tosse paroxística há 5 dias, no qual suspeita-se, por dados epidemiológicos, de infecção por *Bordetella pertussis*, recomenda-se o uso de um dos antibióticos abaixo, EXCETO

- A) claritromicina.
- B) eritromicina.
- C) azitromicina.
- D) sulfametoxazol-trimetoprim.
- E) amoxicilina.

QUESTÃO 15 – O rastreamento de câncer colorretal deve se dar em espaçode tempo menores em indivíduos com os fatores de risco abaixo, EXCETO

- A) história pessoal de pólipo adenomatoso.
- B) antecedente de câncercolorretal.
- C) uso regular prolongado deaspirina.
- D) portadores de retocolite ulcerativa.
- E) história familiar de câncer colorretal.

QUESTÃO 16 – Dos fatores associados a trombose venosa profunda e embolia de pulmão, abaixo citados, o de MAIOR risco é

- A) insuficiência cardíaca congestiva.
- B) restrição ao leito por mais de 48 horas.

- C) uso de contraceptivo oral.
- D) síndrome nefrótica.
- E) diálise crônica.

QUESTÃO 17. Representa fator de risco para osteoporose em mulheres:

- A) hiperprolactinemia.
- B) obesidade.
- C) glaucoma.
- D) hipertireoidismo
- E) raça negra

QUESTÃO 18. Sobre as principais vulvovaginites, considere as assertivas abaixo.

- I. Vaginose bacteriana está relacionada com Ph vaginal $< 4,5$ e teste das aminas positivo.
- II. Hidróxido de potássio é útil para a realização do exame a fresco em caso de vulvovaginite micótica.
- III. O uso de dispositivo intrauterino pode estar associado à presença de *Actinomyces* ao exame citopatológico de colúterino.

Quais são corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III

QUESTÃO 19. Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), o estadiamento do câncer de colo uterino é

- A) clínico.
- B) por imagem.
- C) cirúrgico (cirurgia laparoscópica).
- D) cirúrgico (cirurgia aberta).
- E) clínico e por imagem

QUESTÃO 20. Principal agente etiológico encontrado na mastite puerperal:

- A) *Salmonella sp*
- B) *Stafilococcus aureus*
- C) micobactérias.
- D) *Criptococos*
- E) *Enterobacter sp.*

QUESTÃO 21. Sobre miomas uterinos, assinale a assertiva **incorreta**.

- A) O crescimento uterino isolado não é uma indicação cirúrgica.
- B) A embolização das artérias uterinas pode ser indicada para pacientes nulíparas com miomatose sintomática que desejam engravidar.
- C) Há uma influência genética na gênese dos miomas.
- D) Idade superior a 40 anos aumenta expressivamente a chance de a mulher apresentar algum grau de miomatose
- E) Os miomas pediculados não constituem isoladamente indicação cirúrgica.

QUESTÃO 22. Em relação à pré-eclâmpsia é correto afirmar:

- A) Mulheres pré-eclâmpicas apresentam sensibilidade diminuída a angiotensina II, mesmo antes das manifestações clínicas.
- B) Observam-se pequenas alterações no débito cardíaco, sendo o aumento na pressão arterial dependente principalmente da elevação na resistência vascular periférica.
- C) A fisiopatologia vascular da pré-eclâmpsia não modifica as alterações fisiológicas próprias da gravidez normal.
- D) Não existem evidências morfológicas e/ou bioquímicas de que a pré-eclâmpsia é precedida e/ou acompanhada por dano endotelial.
- E) A lesão renal da pré-eclâmpsia pode ser responsável pelo aumento da filtração glomerular e do clearance de ácido úrico, o último causando a característica hiperuricemia.

QUESTÃO 23. Em relação à doença inflamatória pélvica (DIP), considere as assertivas abaixo.

I - Aumenta o risco de infertilidade por causa tubária.

II - Aumenta o risco de gestação ectópica.

III - Dispositivo intrauterino hormonal aumenta o risco de DIP.

Quais são corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas I e II
- E) I, II e III

QUESTÃO 24. São vantagens do alojamento conjunto

- I. Diminuição dos índices de infecção nos berçários
- II. Aumento dos índices de aleitamento materno
- III. Estabelecimento do vínculo afetivo mãe e filho
- IV. Prática sistemática da mãe canguru

São corretas:

- A) I, II e III
- B) I e III
- C) II e IV
- D) IV
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25. São indicações absolutas de cesariana:

- A) tumor prévio, apresentação pélvica, eclâmpsia.
- B) macrossomia fetal, placenta prévia centro-total, atresia vaginal.
- C) prolapso de cordão, varizes vulvares, primigesta com mais de 35 anos.
- D) cesariana prévia a menos de 1 ano, vício pélvico, condiloma gigante.
- E) Ruptura prematura das membranas, HIV positivo, 2 ou mais cesarianas prévias

QUESTÃO 26. Em uma maternidade do Sistema Único de Saúde, um obstetra plantonista atende a uma parturiente de 40 anos, com gestação de termo, grande múltipara com partos normais, sem intercorrências mórbidas. A pedido do casal realiza, sem vantagens financeiras, cesárea para a consecução da laqueadura tubária. Pode-se afirmar que:

-
- A) Não havendo legislação a respeito, o ato médico foi louvável.
 - B) Ele poderia efetuar a laqueadura pós-parto pela técnica peri-umbilical.
 - C) O obstetra cometeu uma infração e pode ser penalizado.
 - D) ato legal, pois em grande múltipara, outras gestações seriam danosas à paciente, suprimindo a necessidade de autorização prévia da paciente.
 - E) Não há necessidade de credenciamento junto ao SUS para realização deste procedimento cirúrgico

QUESTÃO 27 – Qual é a complicação mais freqüente da transfusão de sangue?

- A) Sobrecarga de volume
- B) Reação hemolítica
- C) Vírus da imunodeficiência humana
- D) Hepatite c
- E) Hepatite b

QUESTÃO 28 – A neoplasia maligna do intestino delgado geralmente se apresenta com:

- A) emagrecimento
- B) dor abdominal
- C) sangramento gastrointestinal
- D) icterícia
- E) perfuração intestinal

QUESTÃO 29 – A causa mais comum de morte relacionada ao cateterismo venoso central é

- A) embolia gasosa
- B) perfuração de veia central
- C) pneumotórax hipertensivo
- D) embolia do próprio cateter
- E) sepse relacionada ao cateter

QUESTÃO 30 – Das medicações abaixo, qual não deve ter seu uso suspenso antes de uma cirurgia eletiva?

- A) Varfarina
- B) Clopidogrel
- C) Marevan
- D) Atenolol
- E) Heparina