



Candidato:

Prova Escrita || ACESSO DIRETO

09|03|2022

---

**QUESTÃO 01** – Aspiração de corpos estranhos para a via aérea por crianças tem uma ocorrência elevada. Um objeto alojado nas vias aéreas não detectado, provavelmente se manifestará na forma de

- I. Atelectasia.
- II. Sibilância.
- III. Tosse crônica.
- IV. Pneumonia recorrente

Está(ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV

**QUESTÃO 02** - Qual das seguintes afirmações é verdadeira com relação às efusões parapneumônicas?

- A) Todos os pacientes com efusão parapneumônica requerem hospitalização..
- B) Todas as efusões parapneumônicas requerem toroscopia para resolução.
- C) Todas as efusões parapneumônicas, se cultivadas, serão positivas para patógenos.
- D) Todas as efusões parapneumônicas requerem intervenção cirúrgica.
- E) Pequenas efusões parapneumônicas são geralmente clinicamente irrelevantes e se resolvem sem intervenção cirúrgica.

**QUESTÃO 03** - Na criança de idade escolar, o patógeno mais provável na pneumonia bacteriana é

- A) *Chlamydia trachomatis*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Streptococcus pneumoniae*.
- D) *Neisseria meningitidis*.
- E) *Haemophilus influenzae*.

**QUESTÃO 04** - Distúrbios eletrolíticos ligados ao sódio (Na<sup>+</sup>) requerem cuidados na sua correção. O prazo ideal para corrigir uma natremia de 155mEq/L, cuja criança apresenta como sintomatologia, apenas irritabilidade é

- A) o mais rápido possível.
- B) 6 horas.
- C) 24 horas.
- D) 72 horas.
- E) 4-5 dias

**QUESTÃO 05** – Recém-nascido (RN), 40 semanas de idade gestacional, Apgar 9/10, apresenta icterícia leve em face com 18 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco. Grupo sanguíneo materno: O+, do RN: B+, Coombs direto negativo coletado em sangue do cordão. Exame físico: ativo, mamando bem e eliminações fisiológicas presentes. Nesse caso, a melhor conduta é:

- A) Suspender o aleitamento materno, pois se trata de icterícia associada ao aleitamento materno
- B) Observar clinicamente e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir sobre a realização de exames
- C) Indicar internação em unidade de terapia intensiva neonatal para a realização de exsanguíneotransfusão, por se tratar de incompatibilidade ABO
- D) Dar alta hospitalar e solicitar retorno para avaliação em 48 horas.

- E) Solicitar exames laboratoriais para avaliar incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia.

**QUESTÃO 06** – Ao prestar assistência em sala de parto a um recém-nascido a termo, você observa que ao romper a bolsa o líquido amniótico encontra-se meconial. Logo após a extração, o recém-nascido está com tônus preservado, mas com movimentos respiratórios irregulares. A conduta apropriada neste caso após o clameamento do cordão umbilical é:

- A) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido, promover o contato pele-a-pele com a mãe e aspirar o nariz do recém-nascido nesta posição para facilitar sua respiração.
- B) Secar o corpo e a cabeça do recém-nascido e promover o contato pele-a-pele com a mãe, sempre friccionando a sua pele para que ele respire normalmente.
- C) Levar o recém-nascido para berço de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar boca e nariz, secar, desprezar campos e avaliar.
- D) Levar o recém-nascido para berço de calor radiante, posicionar a cabeça e aspirar a traqueia, mediante laringoscopia.
- E) Observar a evolução durante 30 minutos.

**QUESTÃO 07** – Quais das drogas antiepiléticas abaixo são consideradas terapias de primeira e segunda linhas para convulsões neonatais?

- A) Diazepam e Fenobarbital.
- B) Fenobarbital e Fenitoína.
- C) Fenitoína e Midazolam.
- D) Fenobarbital e Lorazepam.
- E) Fenobarbital e Ácido valpróico.

**QUESTÃO 08** – É sabido que a síndrome hemolítico-urêmica tem como principal patógeno relacionado, a *E. coli* O157:H7. O principal animal considerado vetor desta cepa de bactéria é da raça

- A) ovina
- B) bovina
- C) suína.
- D) caprina.
- E) equina.

**QUESTÃO 09** – Com qual idade acontecerá a anemia fisiológica da infância para uma criança que nasceu com 39 semanas de idade gestacional e é saudável?

- A) 2-3 semanas.
- B) 2-3 meses.
- C) 3-6 meses.
- D) 6-9 meses
- E) 10-12 meses.

**QUESTÃO 10** – Atraso no diagnóstico de apendicite aguda em crianças pode ter complicações como

- I. Pancreatite
- II. Obstrução intestinal.
- III. Colecistite
- IV. Peritonite.

Está(ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV

**QUESTÃO 11** – Uma mulher de 20 anos, após passar alguns dias de férias na praia, apresenta lesão cutânea pruriginosa no dorso do pé direito, caracterizada como um cordão eritematoso decerca de 4 mm de largura, elevado, com trajeto sinuoso, estendendo-se até o tornozelo. O tratamento de escolha é

- A) cetoconazol.
- B) prednisona.
- C) metronidazol.
- D) furazolidona.
- E) tiabendazol.

**QUESTÃO 12** – Uma mulher de 30 anos procura o médico com resultado de exame de sangue positivo para anti-HCV, constatado em doação de sangue. Ela não apresenta fatores de risco para hepatite C e o resultado foi confirmado em outro laboratório. Dentre as abaixo, a conduta mais adequada será

- A) solicitar transaminases, se normais, acompanhar com dosagens periódicas dessas enzimas.
- B) indicar biópsia hepática.
- C) indicar biópsia hepática se houver aumento de transaminases.
- D) tranquilizar paciente, visto que em mulheres a hepatite C tem risco de cronificação quase nulo.
- E) solicitar pesquisa de RNA do vírus C.

**QUESTÃO 13** – Homem de 45 anos, diabético há 7 anos em acompanhamento irregular, vem à consulta assintomático, com PA de 140/90 mmHg, e trazendo os seguintes exames: hemoglobina glicada de 8,2%, creatinina de 1,2 mg/dL e microalbuminúria de 100 mg/24 horas. O médico que o atende, na tentativa de prevenir o surgimento de insuficiência renal, deve preconizar as seguintes medidas, EXCETO

- A) prescrever inibidor da ECA.
- B) evitar exames que utilizem contraste iodado.
- C) dieta hiperproteica.
- D) manter hemoglobina glicosilada inferior a 7%.
- E) manter pressão arterial inferior a 130/80 mmHg.

**QUESTÃO 14** – Um homem de 25 anos com diarreia, flatulência e meteorismo há 9 meses apresenta anticorpos antiendomísio e antitransglutaminase tissular positivos. Ele mais provavelmente se beneficiará de

- A) dieta sem glúten.
- B) enemas de corticoesteróide.
- C) metronidazol oral por tempo prolongado.
- D) infliximabe.
- E) corticoesteróide sistêmico.

**QUESTÃO 15** – A síndrome do QT longo predispõe ao aparecimento de

- A) *torsades de pointes*.
- B) *flutter* atrial.
- C) BAV total.
- D) taquicardia paroxística supraventricular.

- E) fibrilação atrial

**QUESTÃO 16** – Na anemia da doença crônica espera-se encontrar os achados abaixo, EXCETO

- A) estoque de ferro na medula normal ou aumentado.
- B) inabilidade da medula em aumentar a eritropoiese em resposta à anemia.
- C) transferrina sérica e saturação de transferrina elevadas.
- D) eritropoietina elevada, porém em níveis abaixo do que seria de se esperar para o nível de anemia.
- E) hipoferremia.

**QUESTÃO 17** – Ingestão de oocistos provenientes do solo, ingestão de carne crua e infecção transplacentária são os modos de transmissão de

- A) cisticercose.
- B) histoplasmose.
- C) criptococose.
- D) toxoplasmose.
- E) strongiloidíase.

**QUESTÃO 18** – Em um adulto jovem com quadro de tosse paroxística há 5 dias, no qual suspeita-se, por dados epidemiológicos, de infecção por *Bordetella pertussis*, recomenda-se o uso de um dos antibióticos abaixo, EXCETO

- A) claritromicina.
- B) eritromicina.
- C) azitromicina.
- D) sulfametoxazol-trimetoprim.
- E) amoxicilina.

**QUESTÃO 19** – O rastreamento de câncer colorretal deve se dar em espaços de tempo menores em indivíduos com os fatores de risco abaixo, EXCETO

- A) história pessoal de pólipo adenomatoso.
- B) antecedente de câncer colorretal.
- C) uso regular prolongado de aspirina.
- D) portadores de retocolite ulcerativa.
- E) história familiar de câncer colorretal.

**QUESTÃO 20** – Dos fatores associados a trombose venosa profunda e embolia de pulmão, abaixo citados, o de MAIOR risco é

- A) insuficiência cardíaca congestiva.
- B) restrição ao leito por mais de 48 horas.
- C) uso de contraceptivo oral.
- D) síndrome nefrótica.
- E) diálise crônica.

**QUESTÃO 21.** Representa fator de risco para osteoporose em mulheres:

- A) hiperprolactinemia.
- B) obesidade.
- C) glaucoma.
- D) hipertireoidismo
- E) raça negra

**QUESTÃO 22.** Sobre as principais vulvovaginites, considere as assertivas abaixo.

- I. Vaginose bacteriana está relacionada com Ph vaginal < 4,5 e teste das aminas positivo.
- II. Hidróxido de potássio é útil para a realização do exame a fresco em caso de vulvovaginite micótica.
- III. O uso de dispositivo intrauterino pode estar associado à presença de *Actinomyces* ao exame citopatológico de colúterino.

Quais são corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III

**QUESTÃO 23.** Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), o estadiamento do câncer de colo uterino é

- A) clínico.
- B) por imagem.
- C) cirúrgico (cirurgia laparoscópica).
- D) cirúrgico (cirurgia aberta).
- E) clínico e por imagem

**QUESTÃO 24.** Principal agente etiológico encontrado na mastite puerperal:

- A) *Salmonella sp*
- B) *Stafilococcus aureus*
- C) micobactérias.
- D) Criptococos
- E) *Enterobacter sp.*

**QUESTÃO 25.** Sobre miomas uterinos, assinale a assertiva **incorreta**.

- A) O crescimento uterino isolado não é uma indicação cirúrgica.
- B) A embolização das artérias uterinas pode ser indicada para pacientes nulíparas com miomatose sintomática que desejam engravidar.
- C) Há uma influência genética na gênese dos miomas.
- D) Idade superior a 40 anos aumenta expressivamente a chance de a mulher apresentar algum grau de miomatose
- E) Os miomas pediculados não constituem isoladamente indicação cirúrgica.

**QUESTÃO 26.** Em relação à pré-eclâmpsia é correto afirmar:

- A) Mulheres pré-eclâmpicas apresentam sensibilidade diminuída a angiotensina II, mesmo antes das manifestações clínicas.
- B) Observam-se pequenas alterações no débito cardíaco, sendo o aumento na pressão arterial dependente principalmente da elevação na resistência vascular periférica.
- C) A fisiopatologia vascular da pré-eclâmpsia não modifica as alterações fisiológicas próprias da gravidez normal
- D) Não existem evidências morfológicas e/ou bioquímicas de que a pré-eclâmpsia é precedida e/ou acompanhada por dano endotelial
- E) A lesão renal da pré-eclâmpsia pode ser responsável pelo aumento da filtração glomerular e do clearance de ácido úrico, o último causando a característica hiperuricemia.

**QUESTÃO 27.** Em relação à doença inflamatória pélvica (DIP), considere as assertivas abaixo.

- I - Aumenta o risco de infertilidade por causa tubária.
- II - Aumenta o risco de gestação ectópica.
- III - Dispositivo intrauterino hormonal aumenta o risco de DIP.

Quais são corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas I e II
- E) I, II e III

**QUESTÃO 28.** São vantagens do alojamento conjunto

- I. Diminuição dos índices de infecção nos berçários
- II. Aumento dos índices de aleitamento materno
- III. Estabelecimento do vínculo afetivo mãe e filho
- IV. Prática sistemática da mãe canguru

São corretas:

- A) I, II e III
- B) I e III
- C) II e IV
- D) IV
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29.** São indicações absolutas de cesariana:

- A) tumor prévio, apresentação pélvica, eclâmpsia.
- B) macrossomia fetal, placenta prévia centro-total, atresia vaginal.
- C) prolapso de cordão, varizes vulvares, primigesta com mais de 35 anos.
- D) cesariana prévia a menos de 1 ano, vício pélvico, condiloma gigante.
- E) Ruptura prematura das membranas, HIV positivo, 2 ou mais cesarianas prévias

**QUESTÃO 30.** Em uma maternidade do Sistema Único de Saúde, um obstetra plantonista atende a uma parturiente de 40 anos, com gestação de termo, grande múltipara com partos normais, sem intercorrências mórbidas. A pedido do casal realiza, sem vantagens financeiras, cesárea para a consecução da laqueadura tubária. Pode-se afirmar que:

- A) Não havendo legislação a respeito, o ato médico foi louvável.
- B) Ele poderia efetuar a laqueadura pós-parto pela técnica peri-umbilical.
- C) O obstetra cometeu uma infração e pode ser penalizado.
- D) ato legal, pois em grande múltipara, outras gestações seriam danosas à paciente, suprimindo a necessidade de autorização prévia da paciente.
- E) Não há necessidade de credenciamento junto ao SUS para realização deste procedimento cirúrgico

**QUESTÃO 31 –** Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Considere um acidente automobilístico ocorrido há 45 minutos. A vítima, que usava cinto de segurança, de 29 anos, sexo masculino, apresenta-se consciente, dispneico; com ausência de MV e submacicez em todo hemitórax direito e, quanto ao exame físico, apresentou: FR = 38 irpm, FC =

---

126 bpm, PA = 110x70 mmHG. Analisando o quadro apresentado, a opção de \_\_\_\_\_ representa a maior probabilidade de lesão torácica.

- A) hemotórax à direita
- B) tamponamento cardíaco
- C) ruptura brônquica à direita
- D) ruptura diafragmática à direita
- E) ruptura esofágica

**QUESTÃO 32** – Qual é a complicação mais freqüente da transfusão de sangue?

- A) Sobrecarga de volume
- B) Reação hemolítica
- C) Vírus da imunodeficiência humana
- D) Hepatite c
- E) Hepatite b

**QUESTÃO 33** – O divertículo de Meckel:

- A) é um falso divertículo
- B) é assintomático na maioria dos casos
- C) comumente se apresenta como sangramento gastrointestinal em adultos
- D) comumente se apresenta com obstrução intestinal em crianças
- E) é encontrado em aproximadamente 5-10% da população

**QUESTÃO 34** – A neoplasia maligna do intestino delgado geralmente se apresenta com:

- A) emagrecimento
- B) dor abdominal
- C) sangramento gastrointestinal
- D) icterícia
- E) perfuração intestinal

**QUESTÃO 35** – A causa mais comum de morte relacionada ao cateterismo venoso central é

- A) embolia gasosa
- B) perfuração de veia central
- C) pneumotórax hipertensivo
- D) embolia do próprio cateter
- E) sepse relacionada ao cateter

**QUESTÃO 36** – Das medicações abaixo, qual não deve ter seu uso suspenso antes de uma cirurgia eletiva?

- A) Varfarina
- B) Clopidogrel
- C) Marevan
- D) Atenolol
- E) Heparina

**QUESTÃO 37** – Qual a complicação mais comum da úlcera gástrica?

- A) Transformação maligna



- B) Perfuração
- C) Sangramento gastrointestinal
- D) Obstrução gástrica
- E) Gastroparesia

**QUESTÃO 38** – Dos fatores abaixo, qual o mais comumente relacionado à etiologia dos aneurismas de aorta?

- A) Sífilis
- B) Salmonelose
- C) Aterosclerose
- D) *Diabetes mellitus*
- E) Hipertensão arterial sistêmica

**QUESTÃO 39** – Durante uma cirurgia para apendicite, o apêndice apresenta aspecto normal e a trompa de Falópio apresenta sinais de salpingite. O manejo cirúrgico ideal neste caso deverá ser:

- A) apendicectomia
- B) apendicectomia e salpingectomia
- C) salpingectomia
- D) nenhuma intervenção cirúrgica
- E) somente drenagem com Penrose

**QUESTÃO 40** – Imediatamente após a administração intravenosa de 5.000 UI de heparina, seu efeito pode ser revertido com:

- A) 10mg de sulfato de protamina
- B) 20mg de sulfato de protamina
- C) 30mg de sulfato de protamina
- D) 40mg de sulfato de protamina
- E) 50 mg de sulfato de protamina

**QUESTÃO 41** – Após a conclusão da atividade programada com os alunos de uma escola pública nas proximidades da UBSF, o MFC foi procurado por uma professora do terceiro ano que estava preocupada com uma de suas alunas. Há cerca de um mês, a criança de 9 anos vem exibindo um comportamento estranho. Apresenta uma sonolência excessiva durante as aulas, às vezes chegando ao sono profundo, não conseguindo sequer brincar com os coleguinhas. Com ajuda do ACS, o MFC fica sabendo através de vizinhos que a mãe da criança já relatou utilizar o seu remédio para dormir para acalmar a filha quando ela está agitada em casa. A professora obtém da criança a informação de que às vezes toma um comprimido dado pelo padasto para ela ficar mais calma. O MFC verifica no prontuário eletrônico que a mãe da criança faz uso de clonazepam 2 mg e tem comparecido com maior regularidade para renovação da receita. A professora e o MFC decidem notificar o Conselho Tutelar, que apura a veracidade da informação e aciona o Ministério Público.

Qual o princípio aplicado no âmbito da Promoção da Saúde que fica bastante evidente na situação narrada e serve de base para orientar os trabalhos no contexto do Programa Saúde na Escola (PSE)?

- A) Equidade.
- B) Participação social.
- C) Intersetorialidade.
- D) Integralidade.

**QUESTÃO 42** – O trabalho de várias categorias profissionais dentro de um mesmo serviço de saúde não é novidade. Entretanto, para que as categorias profissionais não trabalhem isoladamente na Atenção Primária à Saúde, baseado nas melhores práticas, o mais adequado seria que:

- A) os profissionais se esforcem para atuar dentro do campo comum de conhecimento da equipe e não no seu núcleo

de saberes.

- B) haja uma dinâmica de trabalho hierarquizada com clara distribuição de tarefas para obter resultados mais eficazes.
- C) as reuniões de equipe sejam espaço rotineiro de avaliação do trabalho dos agentes comunitários de saúde.
- D) a interconsulta (conduta conjunta) de médicos(as) e enfermeiras(os) seja praticada cotidianamente

**QUESTÃO 43** – Jessica tem 32 anos. Vive com o companheiro e 2 filhos. Recentemente foi presa por estar em ponto de venda de drogas no momento de batida policial. Ficou 20 dias longe de casa até ser liberada por ser mãe e não ter ficha policial. Quando retornou à casa foi agredida pelo companheiro. A agressão foi de conhecimento geral da vizinhança. Jessica procurou ajuda da equipe de saúde da família, pois a mesma está com muito medo de sofrer outra agressão, além de estar com ferimentos e medo de procurar a urgência (não se tratava do primeiro episódio de agressão). Você se organiza e no mesmo dia consegue acolhê-la. Após cuidar de seus ferimentos físicos, você aborda com a paciente a possibilidade de rompimento do ciclo de violência doméstica.

A paciente se recusa a procurar a delegacia de proteção à mulher, neste caso, qual seria a melhor conduta?

- A) Notificar o caso de violência ao Conselho Tutelar pois há uma obrigação legal e agendar nova consulta com foco em encorajá-la a denunciar o marido.
- B) Acionar o núcleo de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública e encaminhar a paciente para o serviço de saúde especializado.
- C) Notificar o caso de violência, oferecer encaminhamento para o serviço especializado e agendar nova consulta para acompanhar o caso.
- D) Entregar informações sobre os serviços de proteção à mulher e colocar a equipe à disposição para quando a paciente decidir agir.

**QUESTÃO 44** – Quanto ao método clínico centrado na pessoa, analise as seguintes afirmativas:

I – São características do modelo médico tradicional / convencional a explicação das doenças totalmente através de desvios da norma em variáveis biológicas, papel passivo do paciente, paternalismo e abordagem centrada no médico e/ou na doença.

II – No método clínico centrado na pessoa, há quatro componentes, que devem ser abordados durante a consulta de maneira fluida e interligada: 1) explorando a saúde, a doença e a experiência da doença; 2) entendendo a pessoa como um todo; 3) elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas; e 4) intensificando a relação entre a pessoa e o médico.

III – Em relação ao modelo médico tradicional, a abordagem centrada na pessoa apresenta benefícios: melhora a relação médico-paciente, diminui as reclamações por negligência médica, melhora a satisfação das pessoas com o atendimento e com o médico, melhora a adesão aos tratamentos propostos e reduz as preocupações com saúde e melhora a autoavaliação em saúde.

IV – As principais limitações do método clínico centrado na pessoa são: o enfoque particular dos aspectos psicossociais em detrimento dos aspectos biológicos da doença; a impossibilidade de conciliação do método com a medicina baseada em evidências; a necessidade da existência de equipe multiprofissional e de consultas de longa duração para a aplicação do método de forma adequada.

Estão corretas:

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 45** – Analise as afirmativas a seguir, a partir da Portaria no 2.436 do Ministério da Saúde, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB):

I – A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação

da Atenção Básica, contudo, reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos territórios.

II – A Política Nacional de Atenção Básica define a organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.

III – Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, o cuidado centrado na pessoa, uma das diretrizes da Atenção Básica, aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de forma efetiva.

IV – A Política Nacional de Atenção Básica considera como uma das características fundamentais do processo de trabalho na Atenção Básica a resolutividade, que se refere à capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e demandas de saúde da população, atingindo a solução de problemas de saúde nos usuários.

Estão corretas:

- A) somente as assertivas I, II e III.
- B) somente as assertivas I, II e IV.
- C) somente as assertivas II, III e IV.
- D) somente as assertivas I, III e IV.
- E) todas as assertivas.

**QUESTÃO 46** – Você chega à unidade e a primeira consulta de hoje é com a Dona Magda, matriarca de uma família grande e antiga da cidade. Ela possui 64 anos e não procura frequentemente a assistência em saúde porque sua mãe é uma das moradoras mais antigas da cidade e todos os tratamentos dos filhos, ela que assiste, pois acredita que a “medicina desses moços novos” não tinham tanto efeito quanto as plantas e chás que ela usa, pois essas receitas passam de geração para geração. A consulta, segundo Dona Magda, é porque a mesma gostaria de realizar exames para ver como está sua diabetes. Relata que faz uso de metformina e chás medicinais porque acredita que estes ajudam o remédio da diabetes a fazer efeito. Você verifica que os chás em uso não fazem mal para

o diabetes e para a saúde dela, concorda com o uso e propõe os exames de acompanhamento. Ao final, verifica se Dona Magda concorda com a conduta, ao que responde positivamente com um sorriso no rosto.

Qual é o atributo da Atenção Primária à Saúde caracterizado no caso?

- A) Longitudinalidade.
- B) Competência Cultural.
- C) Coordenação do Cuidado.
- D) Orientação para a comunidade.

**QUESTÃO 47** - Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer outro cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. De acordo com a Portaria nº 204 do Ministério da Saúde, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, analise os agravos a seguir:

I – Coqueluche, febre amarela, dengue, hepatites virais, rubéola.

II – Escarlatina, varicela, caxumba, herpes simples, escabiose.

III – Raiva humana, tétano, leptospirose, sífilis em gestante, sarampo.

IV – Violência doméstica, violência sexual, acidente de trabalho fatal, acidente com animais peçonhentos.

São condições de notificação compulsória no Brasil:

- A) somente as assertivas I, II e III.
- B) somente as assertivas I, II e IV.
- C) somente as assertivas II, III e IV.

- D) somente as assertivas I, III e IV.
- E) todas as assertivas.

**QUESTÃO 48.** Sobre a prática de Medicina Baseada em Evidências e Epidemiologia Aplicada à Clínica, analise as afirmativas a seguir:

I – A Medicina Baseada em evidências é o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências científicas atuais disponíveis para a tomada de decisões sobre o cuidado com os pacientes.

II – Foram desenvolvidos sistemas de hierarquização de níveis de evidências, baseados na valorização do rigor metodológico do delineamento da pesquisa e na priorização de pesquisas com seres humanos, em especial aquelas com desfechos clínicos significativos para o paciente e para a sociedade, como estratégia de identificação das evidências mais relevantes para a clínica.

III – Quanto à validade de um teste diagnóstico, ao compará-lo com o padrão ouro, sabe-se que a sensibilidade é a capacidade do teste em acertar a proporção de verdadeiros-positivos entre os doentes, sendo que testes altamente sensíveis detectam quase todos os doentes.

IV – Quanto à validade de um teste diagnóstico, ao compará-lo com o padrão-ouro, sabe-se que valor preditivo negativo é a capacidade do teste em identificar os indivíduos que não possuem a doença, ou seja, os verdadeiros-negativos entre os não-doentes.

Estão corretas:

- A) somente as assertivas I, II e III.
- B) somente as assertivas I, II e IV.
- C) somente as assertivas II, III e IV.
- D) somente as assertivas I, III e IV.
- E) todas as assertivas.

**QUESTÃO 49.** Quanto à prevenção quaternária e ao rastreamento, analise as seguintes afirmativas:

I – A prevenção quaternária está em consonância com o princípio bioético da não-maleficência (*primo non nocere*), pois busca proteger os pacientes de condutas iatrogênicas.

II – Prevenção quaternária foi definida como a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.

III – São critérios para justificar um determinado rastreamento: o teste de rastreamento deve ser seguro e capaz de detectar a doença em fase assintomática, com baixos índices de falso-negativos e falso-positivos; e a doença a ser rastreada deve ter uma fase pré-clínica (assintomática) conhecida e bem estabelecida e deve ser relativamente frequente e importante do ponto de vista clínico, em termos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade.

IV – O rastreamento ou *screening* é a realização de testes diagnósticos em pessoas assintomáticas, visando ao diagnóstico precoce, tendo como objetivo último reduzir a morbimortalidade da doença rastreada.

Estão corretas:

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 50.** De acordo com as diretrizes de rastreamento no contexto da Atenção Primária em Saúde no Brasil, publicadas pelo Ministério da Saúde (Cadernos de Atenção Primária – número 29 – Rastreamento), avalie as opções a seguir:

I – Não se recomenda o rastreamento de câncer de colo do útero em mulheres com idade maior que 65 anos, que já

---

tenham um exame de Papanicolau normal e que não façam parte do grupo de alto risco para essa patologia.

II – Recomenda-se o rastreamento para o câncer de cólon e reto usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou sigmoidoscopia, em adultos de ambos os sexos, com idades entre 50 e 75 anos.

III – Recomenda-se o rastreamento de câncer de próstata usando dosagem anual de antígeno prostático específico (PSA) em homens assintomáticos com idades entre 75 e 85 anos.

IV – Recomenda-se o rastreamento de câncer de colo do útero em mulheres com idade inferior a 65 anos, sexualmente ativas e que tenham a cérvix (não hysterectomizadas).

São recomendações de rastreamento para detecção precoce de câncer:

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) Todas estão corretas.