

CONCURSO PÚBLICO 2006

Enfermeiro

Biblioteca Central
Coletânea UFSM



BC
E08840

do candidato: _____

- No que se refere à Bioética, a mesma nasceu e se desenvolveu a partir do(a)
- a) pluralismo imoral reinante nos países de cultura ocidental.
 - b) afastamento dos filósofos da moral dos problemas relacionados com a vida humana.
 - c) não-posicionamento de organismos e entidades de saúde.
 - d) não-intervenção do poder legislativo e do poder executivo em questões de proteção à vida.
 - e) grande avanço da biologia molecular e da biotecnologia aplicada à medicina realizados nos últimos anos.

Questão 02

A Lei nº 7.498/86 regulamenta o exercício da Enfermagem e estabelece que ela deve ser exercida privativamente por

- a) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.
- b) Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.
- c) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Enfermagem.
- d) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem e Parteira.
- e) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.

Questão 03

Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, pode-se afirmar quanto aos direitos, que o Enfermeiro

- a) deve recorrer exclusivamente ao Sindicato, quando impedido de cumprir o Código de Ética e a Lei do Exercício Profissional.
- b) pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- c) pode suspender as atividades individuais e coletivas quando a instituição não oferece condições mínimas para o exercício profissional, não sendo necessária a comunicação imediata ao COREN.
- d) deve ser informado somente quando do diagnóstico definitivo de pacientes que estejam sob sua assistência.
- e) deve suspender as atividades individuais, quando a instituição não oferece condições mínimas para o exercício profissional, comunicando a ocorrência ao Sindicato da Saúde.

Questão 04

No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se afirmar:

- a) A integralidade busca assegurar ações e serviços em todos os níveis de acordo com a complexidade de cada caso.
- b) A universalidade garante acesso aos serviços de saúde a todo cidadão por parte do Sistema tanto público como contratado por ele.
- c) A equidade busca atender o homem como um ser integral, voltado à promoção e à recuperação da saúde.
- d) A descentralização é a redistribuição das responsabilidades, sendo que as ocorrências no município são de responsabilidade estadual e federal.
- e) A participação dos cidadãos nos conselhos deliberativos é garantida somente na esfera municipal e local.

Questão 05

Diante do relacionamento interpessoal, a possibilidade de integração no trabalho ocorre a partir de determinadas ações, EXCETO

- a) atitudes abertas às mudanças.
- b) consideração e tolerância pelas verdades dos outros.
- c) desvalorização das atitudes coletivas.
- d) respeito mútuo.
- e) reconhecimento das possibilidades do outro.

Questão 06

Em relação aos cuidados referentes a pacientes acometidos pela tuberculose, pode-se afirmar que

- a) excepcionalmente, dois pacientes podem ser colocados no mesmo quarto.
- b) casos diagnosticados e casos suspeitos devem ocupar o mesmo quarto.
- c) em caso de necessidade, a prioridade de isolamento - precauções com ar - será dada ao paciente com baciloscopia negativa e maior tempo de tratamento.
- d) paciente com diagnóstico confirmado e baciloscopia positiva, ao sair do quarto, deve evitar o uso de máscara.
- e) é impedida a internação em isolamento.

Questão 07

Relacione as Teorias de Enfermagem com as respectivas autoras.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Florence Nightingale | () Teoria ambientalista |
| 2. Wanda Horta | () Teoria de enfermagem transcultural |
| 3. Dorothea Orem | () Teoria das necessidades humanas básicas |
| 4. Madeleine Leininger | () Teoria da adaptação |
| 5. Sister Callista Roy | () Teoria do auto-cuidado |

A sequência correta é

- a) 4 - 1 - 3 - 5 - 2.
- b) 1 - 4 - 2 - 3 - 5.
- c) 2 - 3 - 1 - 4 - 5.
- d) 1 - 4 - 2 - 5 - 3.
- e) 3 - 5 - 1 - 2 - 4.

chamada:	FOLHETO COLETANEA 67
cod barras:	E08840
local:	BC
inclusão:	16/9/2008
n controle:	00036317

Questão 08

Com relação à realização de registro, no prontuário de um paciente, assinale a afirmativa correta.

- a) Fazer as anotações assim que possível, após a realização do procedimento; identificar o horário dos acontecimentos, assinar cada anotação e carimbar com o Registro do COREN no mínimo uma vez em cada turno.
- b) Documentar opiniões com interpretações subjetivas, preencher todo espaço em cada linha e traçar uma linha no espaço que sobrou; assinar cada anotação sem necessidade de carimbo.
- c) Fazer anotações de modo que o familiar não possa entender, utilizar caneta para as anotações, não anotar atividades que não foram executadas.
- d) Fazer uma linha sobre o erro, ao invés de escrever por cima, deixar espaço para anotações posteriores caso haja esquecimento, assinar e carimbar uma vez por dia.
- e) Fazer anotações longas, mas com abreviaturas; anotar as atividades antes de serem executadas para não serem esquecidas, assinar cada anotação e carimbar com o registro do COREN no mínimo uma vez ao dia.

Questão 09

No que se refere às denominações para posições do corpo, relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Posição Genupeitoral | () elevação dos pés da cama de 30° a 45° |
| 2. Posição Decúbito Ventral | () cabeceira da cama elevada pelo menos 45° |
| 3. Posição Decúbito Lateral | () paciente deitado em um dos lados com ambos os braços para frente |
| 4. Posição de Sims | () paciente em decúbito lateral, de modo que o braço inferior fique atrás do corpo do paciente e o superior fletido |
| 5. Posição de Fowler | () paciente ajoelhado e com o peito apoiado na cama |
| 6. Posição de Trendelenburg | () paciente deitado sobre o abdômen com a cabeça voltada para o lado |

A sequência correta é

- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
- 6 - 5 - 3 - 4 - 1 - 2.
- 4 - 1 - 3 - 5 - 2 - 6.
- 3 - 2 - 1 - 6 - 5 - 4.
- 2 - 4 - 5 - 1 - 3 - 6.

Questão 10

Como proceder para administrar 1,5 mg da droga X quando se dispõe de um frasco contendo a concentração de 2 mg/mL?

Qual o volume que deverá ser retirado do frasco?

- 1,75 mL
- 1,25 mL
- 1,0 mL
- 1,5 mL
- 0,75 mL

Questão 11

Durante o exame físico, o Enfermeiro realiza a avaliação respiratória do paciente, devendo classificar os padrões respiratórios. Associe as colunas, relacionando o padrão respiratório com a sua descrição.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Respiração Kussmaul | () períodos de apnéia alternando irregularmente com uma série de respirações superficiais de igual profundidade |
| 2. Cheyne-Stokes | () respiração periódica associada a períodos de apnéia, alternando regularmente com uma série de ciclos respiratórios |
| 3. Respiração atáxica (Biot) | () respirações profundas, regulares, com um aumento na frequência respiratória |
| 4. Apneuse | () fase inspiratória longa e forçada seguida de uma fase respiratória curta e inadequada |

A sequência correta é

- 3 - 1 - 2 - 4.
- 4 - 2 - 1 - 3.
- 2 - 4 - 3 - 1.
- 3 - 2 - 1 - 4.
- 1 - 3 - 4 - 2.

Questão 12

Os vasos sanguíneos frequentemente utilizados para a punção venosa no adulto são, EXCETO

- basílica.
- cefálica.
- femoral.
- mediana.
- metacarpianas dorsais.

Questão 13

Em relação aos métodos de proteção anti-infecciosa - limpeza, esterilização, desinfecção de artigos e anti-sepsia - relacione as colunas:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. glutaraldeído | () indicado para endoscópios e aparelhos com lentes |
| 2. hipoclorito | () metais resistentes à oxidação |
| 3. iodo | () não é recomendado para borrachas, plásticos e cimento de lentes. |
| 4. álcool etílico 7% | () superfícies, artigos plásticos e borrachas. |

A sequência correta é

- a) 4 - 3 - 2 - 1.
- b) 2 - 4 - 3 - 1.
- c) 4 - 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 4 - 2.
- e) 3 - 1 - 2 - 4.

Questão 14

Assinale a alternativa correta, em relação aos cuidados de Enfermagem, no período pós-operatório, realizados na Sala de Recuperação pós-anestésica.

- a) Não mudar o paciente de posição e, se o fizer, deve ser rapidamente.
- b) Verificar os sinais vitais de 30 em 30 minutos na primeira hora do pós-operatório.
- c) Observar aumento de pressão arterial, bradicardia e aumento de diurese, que são sinais de hipovolemia.
- d) Estar atento aos sinais e sintomas dos estados de choque como pulso bradicárdico e fino.
- e) Observar a posição do paciente na cama como, por exemplo, Trendelenburg, em pacientes submetidos à cirurgia de varizes.

Questão 15

O coma diabético é causado por

- a) hiperglicemia.
- b) hipoglicemia.
- c) glicose com taxas normais no sangue.
- d) aumento de insulina no sangue.
- e) diminuição de insulina no sangue.

Questão 16

Na avaliação de feridas, a atuação do Enfermeiro é evidenciada pelo conhecimento técnico-científico das fases de cicatrização. Assinale a alternativa que apresenta características da fase proliferativa.

- a) Há reorganização das fibras de colágeno, processo este que continua até que o tecido cicatricial tenha recuperado cerca de 80% da força original da pele.
- b) Surge o tecido de granulação, há estímulo da produção de colágeno o que proporciona estrutura ao tecido e ocorre o processo de epitelização.
- c) É o momento defensivo ou reativo que se constitui na agregação plaquetária.
- d) Há edema, eritema, calor e dor, começa no momento da lesão inicial e, tipicamente, dura de 4 a 6 dias.
- e) Ocorre o surgimento dos macrófagos para destruição das bactérias no local da ferida, que realiza a limpeza dos resíduos celulares.

Questão 17

No atendimento a paciente com trauma, a lesão que pode marcar outras lesões pela ausência de sensibilidade ou inabilidade de sentir dor é

- a) disfunção autonômica.
- b) luxação cervical.
- c) lesão medular.
- d) traumatismo tóraco-lombar.
- e) múltiplos traumas torácicos.

Questão 18

No paciente em condicionamento para transplante de medula óssea, com altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia e imunossupressores, é correto afirmar que o Enfermeiro deverá

- a) verificar sinais vitais somente no início da infusão da droga.
- b) não informar ao paciente o que ele irá receber e orientá-lo a relatar alterações percebidas.
- c) utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - luva, máscara, avental - durante a administração da droga.
- d) checar o horário da administração do medicamento no relatório de enfermagem.
- e) conferir o quimioterápico quanto a sua estabilidade em refrigeração somente.

Questão 19

Um paciente chega ao Pronto Socorro com inchaço na parte inferior das pernas e escarro rosado e espumoso. O mesmo está apresentando sinais de

- a) angina do peito.
- b) insuficiência cardíaca congestiva.
- c) infarto do miocárdio.
- d) parada cardíaca.
- e) acidente vascular cerebral.

Questão 20

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas no que se refere a Doenças Cardiovasculares e Acidente Vascular Cerebral.

- () A dor na angina aparece subitamente, mas costuma estar associada a esforço físico.
- () A angina é uma lesão irreversível, que causa danos permanentes ao coração.
- () A aterosclerose ocorre quando substâncias gordurosas se depositam no revestimento interno da parede arterial.
- () No infarto agudo do miocárdio, os sintomas podem ser transpiração, fraqueza, náusea e palidez.
- () No Acidente Vascular Cerebral isquêmico, ocorre rompimento de um vaso sanguíneo cerebral.

A sequência correta é

- a) V - F - V - V - F.
- b) V - V - V - V - V.
- c) F - V - V - V - F.
- d) F - V - F - F - V.
- e) V - F - F - V - V.

Questão 21

São complicações que podem ocorrer durante a hemodiálise:

- a) perfuração de vasos sanguíneos e de alças intestinais, peritonite.
- b) hipotensão, distensão abdominal, peritonite.
- c) dor torácica, câibras, diarreia.
- d) hipervolemia, embolia gasosa, câibras musculares.
- e) perfuração da bexiga, hipervolemia, prurido.

Questão 22

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas sobre a Insuficiência Renal.

- () A insuficiência renal aguda pode ser classificada em pré-renal, renal e pós-renal.
- () A insuficiência renal crônica é a deterioração progressiva dos rins, provocando a sua incapacidade permanente.
- () Os sinais/sintomas mais freqüentes na insuficiência renal crônica são hipotensão, edema generalizado, dispnéia.
- () Os sinais mais freqüentes na insuficiência renal aguda são hipertensão arterial, aumento do volume urinário, anemia.
- () As formas mais comuns de diálise incluem a hemodiálise e a diálise peritoneal.

A sequência correta é

- a) V - V - F - V - F.
- b) F - F - V - V - F.
- c) F - V - V - V - F.
- d) V - V - F - F - V.
- e) V - F - F - F - V.

Questão 23

O profissional de saúde se depara no cotidiano com situações-limite como a da morte. Dessa forma, o paciente terminal passa por diversos estágios. Assinale a alternativa correta em relação aos estágios da morte.

- a) Negação e irritabilidade, barganha, preocupação, serenidade, aceitação.
- b) Rejeição e inquietação, raiva, barganha, depressão, reconciliação.
- c) Depressão e sensação de inutilidade, repúdio, barganha, aceitação.
- d) Depressão e hostilidade, barganha, raiva, reconciliação, aceitação.
- e) Negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação.

Questão 24

Na assistência ao paciente em Unidade de Tratamento Intensivo, é indispensável ter o material de assistência ventilatória para Entubação Endotraqueal que inclui

- a) anestésico xilocaína 2% sem vaso constritor, lâmina de bisturi, seringas de 10 mL.
- b) ambu montado e máscara, laringoscópio montado com lâmina, tubos endotraqueais.
- c) cânulas de traqueostomia, ambu montado e máscara, luvas descartáveis.
- d) óculos e máscara para o médico, seringas de 10 mL, bandeja de traqueostomia.
- e) lâmina de bisturi, catéter teflon nº 18, fonte de oxigênio.

Questão 25

Para verificar a Pressão Venosa Central, o Enfermeiro deverá atentar para os seguintes cuidados:

- a) Manter o paciente em decúbito dorsal, sem travesseiros.
- b) Manter o paciente em decúbito dorsal com 02 (dois) travesseiros.
- c) Não suspender a administração da infusão endovenosa que está sendo administrada.
- d) Colocar a linha média no mesmo nível do ponto +1.
- e) Alinhar o ponto zero da fita graduada no mesmo nível da aurícula esquerda do paciente.

Questão 26

Relacione as colunas, considerando os tipos de choque.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Choque Cardiogênico | () perda, pelo sistema nervoso, do controle do diâmetro vascular |
| 2. Choque Hipovolêmico | () reação alérgica intensa |
| 3. Choque Séptico | () perda de plasma pela parede do vaso, diminuindo o volume de sangue |
| 4. Choque Neurogênico | () redução aguda do sangue circulante determinado pelo seqüestro hídrico |
| 5. Choque Anafilático | () incapacidade do coração de bombear o sangue de forma efetiva |

A seqüência correta é

- a) 4 - 5 - 3 - 2 - 1.
- b) 4 - 5 - 2 - 3 - 1.
- c) 5 - 4 - 3 - 1 - 2.
- d) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.
- e) 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Questão 27

Em relação às fissuras mamárias, assinale a alternativa correta.

- a) A lavagem dos mamilos deve ser feita antes e após as mamadas.
- b) É indicado o uso de óleos e lubrificantes nas mamas e mamilos ainda no pré-natal.
- c) A mama mais ingurgitada e o mamilo mais dolorido devem ser, primeiramente, oferecidos ao lactente.
- d) A exposição das mamas ao sol ou ao ar pode auxiliar no tratamento das fissuras.
- e) O uso de sabonetes especiais auxilia no fortalecimento dos mamilos.

Questão 28

Segundo a última recomendação da American Heart Association (Guideline 2000) a frequência de compressão em pacientes em paradas cárdiorrespiratórias deve ser de

- a) 15 compressões para 3 ventilações para 2 socorristas.
- b) 15 compressões para 2 ventilações para 1 ou 2 socorristas.
- c) 10 compressões para 1 ventilação para 2 socorristas.
- d) 15 compressões para 1 ventilação para 1 socorrista.
- e) 10 compressões para 2 ventilações para 1 ou 2 socorristas.

Questão 29

O Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS) visa ao atendimento na sistemática dos A-B-C's, onde o D refere-se

- a) a vias aéreas com controle cervical.
- b) à circulação com controle de hemorragias.
- c) à exposição da vítima.
- d) ao estado neurológico.
- e) à respiração.

Questão 30

De acordo com a Escala de Coma de Glasgow (ECG), é correto afirmar em relação ao Trauma Craniencefálico (TCE):

- a) ECG entre 11 e 12 indica TCE moderado.
- b) ECG menor ou igual a 8 indica TCE grave.
- c) ECG entre 11 e 15 indica TCE leve.
- d) ECG entre 09 e 15 indica TCE leve.
- e) ECG entre 07 e 11 indica TCE moderado.

Questão 31

A síndrome de abstinência pode se assemelhar a vários distúrbios psiquiátricos e é caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas:

- I. insônia, fraqueza muscular, febre.
- II. crises convulsivas, alucinações, anorexia.
- III. batimentos cardíacos diminuídos.
- IV. orientação, sem distúrbios no processo de raciocínio.
- V. náusea e vômitos.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I, II e IV.
- c) apenas I, II e V.
- d) apenas III e IV.
- e) apenas III e V.

Questão 32

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª no que se refere às doenças ocasionadas por vírus e o correspondente modo de transmissão.

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Meningites | () via fecal e oral |
| 2. Hepatite A | () sangue, hemoderivado, sêmen, secreção vaginal, leite materno |
| 3. Hepatite B e C | () contato íntimo com superfície mucosa ou de lesão infectante |
| 4. AIDS | () oral, fecal, secreções respiratórias |
| 5. Herpes simples | () relações sexuais, agulhas contaminadas, transfusão sanguínea |

A sequência correta é

- a) 2 - 3 - 5 - 1 - 4.
- b) 1 - 4 - 5 - 2 - 3.
- c) 2 - 4 - 5 - 1 - 3.
- d) 5 - 4 - 2 - 3 - 1.
- e) 1 - 4 - 5 - 2 - 3.

Questão 33

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma que, nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente, a ocorrência deverá ser comunicada, sem prejuízo de outras providências legais

- a) ao conselho tutelar da respectiva localidade.
- b) ao médico do hospital.
- c) ao posto de saúde mais próximo.
- d) ao delegado de polícia.
- e) ao diretor da escola.

Questão 34

A assistência ao puerpério tem como objetivo monitorar a regressão das alterações anatômicas e funcionais da gravidez. Em geral, o puerpério ocorre

- a) após a conclusão do segundo estágio do trabalho de parto até o 30º dia após o nascimento.
- b) após a conclusão do terceiro estágio do trabalho de parto até o 7º dia após o nascimento.
- c) após a conclusão do terceiro estágio do trabalho de parto até o 45º dia após o nascimento.
- d) após a conclusão do terceiro estágio do trabalho de parto até o 30º dia após o nascimento.
- e) após o início do trabalho de parto até o 60º dia após o nascimento.

Questão 35

A criança que tem diagnóstico confirmado de HIV positivo, com sintomas da doença, deve receber a vacina

- a) Sabin.
- b) Tríplice viral.
- c) Rubéola / Sarampo.
- d) SALK.
- e) BCG.

Questão 36

Considera-se um lactente a termo aquele que apresenta:

- a) peso entre 2.500 a 4.000 g, pele vermelha e lisa, apgar entre 7 e 10 no 1º e 5º minuto após o nascimento, fígado palpável, baço impalpável.
- b) peso entre 2.000 a 4.200 g, pele vermelha brilhante, apgar entre 9 e 10 no 1º e 5º minuto após o nascimento, fígado impalpável, baço palpável.
- c) peso entre 3.000 a 3.700 g, pele rosada mudando para vermelha brilhante, apgar entre 9 e 10 no 1º e 5º minuto após o nascimento, leitos ungueais rosados com cianose transitória.
- d) peso entre 2.000 a 4.000 g, choro inicialmente fraco, pele rosada, edema e congestão ao redor dos olhos, leitos ungueais rosados com cianose permanente.
- e) peso entre 1.800 a 3.000 g, choro forte, pele vermelha e lisa, fígado impalpável, baço palpável.

Questão 37

O trabalho de parto efetivo pode ser dividido em quatro estágios:

- a) dilatação, contração, expulsão, eliminação placentária.
- b) contração, dilatação, rotação, expulsão.
- c) dilatação, expulsão, desprendimento e eliminação placentária e, uma a quatro horas após a eliminação placentária, as contrações uterinas controlam o sangramento.
- d) contração, dilatação, rotação, desprendimento e eliminação placentária.
- e) dilatação, rotação, expulsão e, uma a quatro horas após a eliminação placentária, as contrações uterinas controlam o sangramento.

CONCURSO PÚBLICO 2006
GABARITO

Questões	Alternativas
BIÓLOGO	
01.	D
02.	D
03.	C
04.	E
05.	A
06.	B
07.	E
08.	D
09.	B
10.	D
11.	B
12.	A
13.	C
14.	B
15.	B
16.	D
17.	A
18.	C
19.	D
20.	C
21.	E
22.	A
23.	A
24.	E
25.	A
26.	B
27.	E
28.	D
29.	E
30.	E
31.	E
32.	A
33.	A
34.	D
35.	B
36.	C
37.	C
38.	A
39.	B
40.	D

Questões	Alternativas
ENFERMEIRO	
01.	E
02.	E
03.	B
04.	B
05.	C
06.	A
07.	D
08.	A
09.	B
10.	E
11.	D
12.	C
13.	D
14.	E
15.	A
16.	B
17.	C
18.	C
19.	B
20.	A
21.	D
22.	D
23.	E
24.	B
25.	A
26.	A
27.	D
28.	B
29.	D
30.	B
31.	C
32.	C
33.	A
34.	C
35.	D
36.	A
37.	C
38.	E
39.	E
40.	E