

FOLHETO COLETÂNEA
6934

→ consulta local
→ Acervo coletânea

FOLHETO
COLETÂNEA
6934




BC

E09575

Universidade Federal de Santa Maria

UFSM
Biblioteca Central



1960

escultura: Luiz Gonzaga ... foto: Victorio Venturini

concurso público 2009

número da inscrição

nome do candidato

cargo

enfermeiro

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

609575

conhecimentos específicos

- 01 De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, pode-se afirmar, quanto ao Capítulo IV "Dos Deveres", que ao enfermeiro é permitido, EXCETO
- a) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - b) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
 - c) Suspender suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, não sendo necessário comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem.
 - d) Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
 - e) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
-
- 02 De acordo com o Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498/86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, ao enfermeiro cabe, privativamente, no Artigo 8º:
- a) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
 - b) Realização de episiotomia e episiorrafia, com aplicação de anestesia local, quando necessário.
 - c) Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto com distócia.
 - d) Prescrição da assistência de enfermagem e médica.
 - e) Prestação de assistência à parturiente e ao parto normal com episiotomia.
-
- 03 O Programa "Hospital Amigo da Criança" do Ministério da Saúde criou passos essenciais chamados "Dez passos para o sucesso do aleitamento". Quanto a esses passos, pode-se afirmar que o hospital e a equipe de saúde devem
- I. informar todas as gestantes sobre as vantagens e normas do aleitamento materno.
 - II. praticar o alojamento conjunto quando o recém-nascido for de baixo peso.
 - III. ajudar as mães a iniciarem o aleitamento somente após a terceira hora após o parto.
- Está (ão) correta (s)
- a) apenas I.
 - b) apenas II.
 - c) apenas III.
 - d) apenas I e II.
 - e) apenas II e III.

- 04 Considerando os distúrbios respiratórios, é correto afirmar que a doença broncopulmonar obstrutiva crônica (DBPOC) é o conjunto de
- a) bronquite aguda, enfisema e asma brônquica.
 - b) asma brônquica, pneumonia e enfisema.
 - c) enfisema, bronquite aguda e pneumonia.
 - d) bronquite crônica, pneumonia e enfisema
 - e) bronquite crônica, enfisema e asma brônquica.
-
- 05 Quanto à família e à hospitalização da criança, evidencia-se a importância do enfermeiro quando
- a) desconhece que a intensidade do sofrimento varia para cada criança e família e está vinculada à idade dela.
 - b) determina que pais ou responsáveis tenham horários rígidos e sem rodízios no cuidado, para não prejudicar a criança e o tratamento.
 - c) reconhece que a criança com idade aproximada de 1 a 3 anos tem como principais fontes de sofrimento a ausência de pessoas de referência e o medo da doença.
 - d) respeita a ansiedade, o medo e o choro de crianças e pais, mas deixa clara a necessidade de realizar certos procedimentos.
 - e) determina que os pais não realizem outras atividades além do cuidado com a criança internada.
-
- 06 No que se refere às fases do planejamento normativo ou tradicional, pode-se afirmar que
- a) na fase 1, a determinação dos objetivos são os alvos selecionados que se buscam alcançar.
 - b) na fase 4, há o estabelecimento do plano operacional, explicitando seu conteúdo, a extensão do tempo a ser utilizado e a amplitude das ações.
 - c) na fase 3, há o estabelecimento de prioridades de ação para o alcance dos objetivos.
 - d) na fase 2, realiza-se o diagnóstico, o conhecimento do sistema como um todo.
 - e) na fase 5, o aperfeiçoamento inclui as fases de avaliação e replanejamento das ações a serem desenvolvidas.
-
- 07 Quanto à doença hipertensiva específica da gestação (DHEG), pode-se afirmar que
- a) na pré-eclâmpsia leve, a pressão arterial da gestante é maior que 160/110 mmHg.
 - b) a eclâmpsia caracteriza-se pelos sinais e sintomas da pré-eclâmpsia grave, ocorrendo crises convulsivas que podem evoluir para o coma.
 - c) na pré-eclâmpsia grave, a gestante apresenta proteinúria no limite fisiológico de 0,6g nas 24 horas.
 - d) na pré-eclâmpsia grave, o tratamento deve ser feito no ambulatório, com prescrição de repouso absoluto da gestante.
 - e) ocorre antes de 20 semanas de gestação e se caracteriza pela presença de hipertensão, edema e proteinúria.

08 Quanto às principais vacinas em uso de rotina, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas.

- () A Tríplice (DPT) é contra sarampo, difteria e coqueluche.
- () A Dupla (DT) é contra tétano e difteria.
- () A Tríplice Viral (MMR) é contra caxumba, rubéola e sarampo.
- () A Tríplice (DPT) é contra tétano, difteria e caxumba.

A sequência correta é

- a) V - F - F - V.
- b) F - F - V - V.
- c) V - F - V - F.
- d) V - V - F - F.
- e) F - V - V - F.

09 No que se refere à hipertensão arterial, pode-se afirmar que

- I. a hipertensão caracteriza-se pela pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e uma pressão diastólica maior que 90 mmHg.
- II. a hipertensão secundária é aquela em que não é possível identificar as causas que a originam.
- III. a diabetes melito e a dislipidemia não são fatores de risco cardiovasculares potencializadores da hipertensão.
- IV. pessoas com hipertensão arterial podem permanecer assintomáticas, por muitos anos.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas II, III e IV.
- e) apenas I, III e IV.

10 No processo de envelhecimento e adoecimento do idoso, pode-se identificar alguns sinais e sintomas específicos como:

- a) Na pneumonia, a febre e a "pontada no peito" estão ausentes.
- b) A dor torácica é sempre presente no infarto do miocárdio.
- c) A dispnéia é presente e severa na insuficiência cardíaca congestiva.
- d) Na pneumonia, a maior parte dos casos decorre de infecção pulmonar e não de aspiração.
- e) No infarto do miocárdio, nunca há sintoma associado à dor nos ombros ou na mandíbula.

11 São atribuições específicas dos enfermeiros das equipes de saúde da família

- a) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, sendo responsável pelo acompanhamento do usuário.
- b) Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- c) Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos e cirúrgicos.
- d) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade da Saúde da Família.
- e) Solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, independentemente das disposições legais da profissão.

12 Na necessidade de administrar 1,8 mg da droga X e dispor-se de frasco contendo a concentração de 3 mg/ml, qual volume deverá ser retirado do frasco?

- a) 1,6 ml.
- b) 0,6 ml.
- c) 0,3 ml.
- d) 1,8 ml.
- e) 0,8 ml.

13 Todos os procedimentos relacionados são cuidados de enfermagem à criança em ventilação mecânica, EXCETO

- a) Verificar sinais vitais da criança e parâmetros do respirador com frequência.
- b) Trocar filtro ou Água Destilada ou a jarra do umidificador a cada 24 horas.
- c) Trocar circuito de traqueias, conforme a rotina do serviço.
- d) Trocar a fixação do tubo endotraqueal sempre que houver necessidade, ou a cada 24 horas.
- e) Aspirar secreções do tubo endotraqueal e oronasofaríngeas somente a cada 24 horas.

14 Quanto à hepatite A, pode-se afirmar que

- a) a transmissão ocorre através da pele e mucosas lesionadas, nas relações sexuais, transfusões de sangue e uso de drogas injetáveis.
- b) tem como medida preventiva, a vacinação de pessoas expostas ao risco de contaminação.
- c) pode ser transmitida pela ingestão de alimentos que tenham contato com água contaminada.
- d) é contraída na transmissão vertical com frequência.
- e) o período de incubação da doença ocorre de 45 a 180 dias e, em média, de 60 a 90 dias.

15 São cuidados para evitar a transmissão materno-infantil do vírus da imunodeficiência humana (HIV):

- I. Evitar a amniotomia, a amniocentese e a episiotomia.
- II. Contraindicar a cesariana eletiva em caso de bolsa rota de gestante com carga viral desconhecida.
- III. Reduzir, ao máximo, a exposição do recém-nascido ao sangue e às secreções maternas.
- IV. Iniciar o aleitamento materno e/ou cruzado imediatamente após a cesariana.

Estão corretas

- a) apenas I e IV.
- b) apenas I e II.
- c) apenas II, III e IV.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e IV.

16 Os períodos clínicos ou fases da evolução do trabalho de parto são, respectivamente,

- a) dilatação, dequitação, expulsão e recuperação/Greenberg.
- b) dequitação, dilatação, expulsão e recuperação/Greenberg.
- c) dilatação, expulsão, dequitação e recuperação/Greenberg.
- d) expulsão, dilatação, recuperação/Greenberg e dequitação.
- e) dilatação, recuperação/Greenberg, expulsão e dequitação.

17 Quanto ao aleitamento materno, pode-se afirmar que

- a) para a prevenção de fissuras ou rachaduras não se deve lavar as mamas antes e após as mamadas.
- b) na ocorrência de mastite, a puérpera deve interromper o aleitamento materno, não deixando o bebê mamar no seio afetado.
- c) se deve usar óleos ou pomadas para tratar fissuras nas mamas.
- d) se houver engurgitamento mamário, não é indicado aplicar compressas mornas, porque induzem ao aumento da produção de leite.
- e) no tratamento da mastite, deve-se aplicar compressas quentes antes da formação do abscesso e frias após a formação do abscesso.

18 Quanto às alterações do paciente com distúrbios psíquicos, pode-se afirmar que

- a) na verborréia ou taquilalia, o paciente fala muito menos do que falava anteriormente à manifestação deste distúrbio.
- b) na hiperímia, há uma diminuição da gesticulação e das expressões faciais, associada ao mutismo.
- c) na amnésia, há uma diminuição geral da memória, especialmente para determinados fatos.
- d) na ambivalência afetiva, o paciente manifesta reação diferente da esperada pela maioria das pessoas.
- e) na desagregação, o paciente não evidencia um pensamento lógico, o que inviabiliza a compreensão do que é dito por ele.

19 Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, associando as Teorias de Enfermagem às suas respectivas autoras.

- | | |
|---|---|
| 1) Imogene King | () Teoria do Ser Unitário |
| 2) Florence Nightingale | () Teoria da Relação Interpessoal |
| 3) Martha E. Rogers | () Teoria Ambientalista |
| 4) Wanda Horta | () Teoria do Alcance de Objetivos |
| 5) Joyce Travelbee | () Teoria das Necessidades Humanas Básicas |
| 6) Beatriz B. Capella e Maria Tereza Leopardi | () Teoria Sócio-humanista |

A sequência correta é

- 4 - 2 - 5 - 3 - 6 - 1.
- 3 - 4 - 1 - 6 - 5 - 2.
- 3 - 5 - 2 - 1 - 4 - 6.
- 5 - 1 - 6 - 4 - 3 - 2.
- 1 - 6 - 3 - 2 - 5 - 4.

20 Foram prescritos para o paciente 500 ml de solução de glicose a 5%, endovenosa, para serem administrados em 8 horas. Quantas microgotas deverão ser infundidas por minuto?

- 56.
- 63.
- 98.
- 120.
- 80.

21 As medidas essenciais na assistência de enfermagem aos pacientes portadores de doenças hematológicas são:

- Administrar medicamentos, de preferência por via intramuscular ou subcutânea, principalmente nos portadores de distúrbios plaquetários.
- Promover a adequada higiene oral para evitar infecções, e utilizar soluções como água bicarbonatada fria e chá de camomila.
- Oferecer, durante o período de suscetibilidade às infecções, alimentos como verduras e frutas cruas.
- Orientar o paciente a utilizar escova dental normal para a limpeza dos dentes quando houver menos de 5000 plaquetas.
- Monitorar a temperatura diariamente, em intervalos longos, para não incomodar o paciente.

22 No que se refere aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que

- I. na equidade, não só todos têm direito, como ele deve ser provido de forma igualitária, assegurando ações e serviços em todos os níveis de assistência.
- II. a universalidade implica o reconhecimento de que cada indivíduo é um todo indivisível e integrante de uma sociedade ou comunidade.
- III. a integralidade é a não-discriminação de qualquer cidadão em relação às ações e serviços de saúde.
- IV. as Conferências e os Conselhos de Saúde são foros que devem efetivar o controle social.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas III e IV.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I e IV.
- e) apenas II e IV.

23 Um dos princípios da Bioética é a Beneficência e deve ser entendido como

- a) a obrigação de ajudar aos outros, sempre a favor dos seus interesses.
- b) o dever de se abster de fazer qualquer mal para os pacientes.
- c) o respeito à autodeterminação dos pacientes.
- d) a distribuição adequada de deveres e de benefícios sociais.
- e) proteção ao paciente, evitando qualquer situação que possa significar um risco desnecessário.

24 São padrões mínimos de segurança na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI-RN):

- a) registro de observação nos impressos próprios somente uma vez no turno, a fim de assegurar a continuidade da assistência.
- b) troca das incubadoras para limpeza mensalmente, como medida profilática à infecção.
- c) educação permanente somente dos enfermeiros, considerando a necessidade de coordenação da equipe de enfermagem.
- d) condutas não-uniformes, a fim de manter a autonomia de cada profissional.
- e) manutenção dos equipamentos e do material em perfeitas condições de funcionamento.

25 Considerando o Processo de Enfermagem, indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.

- () Enfermagem é um processo que inclui os agentes: indivíduo enfermo ou sadio e profissional de enfermagem.
- () A interação inicial não deve incluir a família ou outras pessoas significativas na situação.
- () Quando o enfermeiro se engaja no processo de Enfermagem de forma ética e com competência técnica, desenvolve uma ação sistematizada e finalística.

A sequência correta é

- a) F - F - V.
- b) V - F - F.
- c) F - V - V.
- d) V - F - V.
- e) F - V - F.

26 Quanto ao processo de esterilização, pode-se afirmar que

- a) na autoclavação, a pressão é usada para manter a temperatura entre 30°C e 40°C.
- b) na pasteurização, o material é aquecido, submetido ao resfriamento lento e, após, à fervura a 100°C.
- c) a esterilização por óxido de etileno é gasosa, bactericida e tem um alto custo.
- d) a radiação não-ionizante é o processo nuclear de destruição de bactérias nas suas diferentes formas de virulência e de vida.
- e) a flambagem é a destruição dos germes e do material por carbonização.

27 Quanto ao puerpério, pode-se afirmar que

- a) é considerado imediato, do 1º ao 10º dia pós-parto.
- b) é identificado como tardio, após os 45 dias pós-parto.
- c) é denominado remoto ou longínquo, entre o 10º e o 45º dia pós-parto.
- d) é o espaço de tempo compreendido entre o período expulsivo e o de dequitação.
- e) é identificado como imediato, do 1º ao 45º dia pós-parto.

28 Considerando as vias de administração de drogas injetáveis e suas características, relacione as colunas:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Via Intradérmica | () A medicação é absorvida no tecido subcutâneo, de forma lenta e contínua. |
| 2) Via Hipodérmica | () Usa-se o ângulo de 15 graus, com bisel da agulha voltado para cima. |
| 3) Via Intramuscular | () Permite a administração de grande volume de líquidos. |
| 4) Via Endovenosa | () Após a via endovenosa, é a via de mais rápida absorção. |

A sequência correta é

- a) 3 - 4 - 2 - 1.
- b) 2 - 1 - 4 - 3.
- c) 4 - 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 2 - 3 - 4.
- e) 1 - 3 - 4 - 2.

29 Associe o tipo de curativo a sua descrição

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Asséptico | () Não necessariamente estéril. |
| 2) Compressivo | () Possui vedação hermética e impermeável. |
| 3) Úmido | () Livre de bactérias. |
| 4) Estéril seco | () Estéril que não apresenta umidade. |
| 5) Gase vaselinada | () Estanca ou controla sangramento. |
| 6) Oclusivo | () Estéril, saturado com substância para evitar que o curativo se fixe no ferimento. |

A sequência correta é

- 2 - 1 - 3 - 5 - 4 - 6.
- 6 - 3 - 5 - 2 - 1 - 4.
- 5 - 4 - 2 - 1 - 6 - 3.
- 4 - 2 - 6 - 3 - 5 - 1.
- 3 - 6 - 1 - 4 - 2 - 5.

30 Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das alternativas que se referem aos tipos de choques.

- () No choque hemorrágico, geralmente causado por trauma múltiplo e queimaduras graves, não existe sangue suficiente para a circulação corporal.
- () No choque neurogênico, há uma lesão medular ou cefálica ocasionando perda do controle nervoso, os vasos dilatam e não há sangue para enchê-los.
- () No choque metabólico, as toxinas causam dilatação dos vasos sanguíneos, acúmulo de sangue nos vasos capilares pequenos e invasão dos vasos sanguíneos por bactérias.
- () No choque séptico, há uma reação alérgica intensa, geralmente à picada de insetos, alimentos ou medicamentos.

A sequência correta é

- F - F - F - V.
- F - V - V - F.
- V - F - V - V.
- V - V - F - F.
- V - V - V - F.

31 O paciente em parada cardiorrespiratória apresenta

- pupilas mióticas após 45 segundos da interrupção da circulação.
- perda súbita de consciência.
- dor no peito e palpitação.
- presença de pulso carotídeo ou femoral.
- presença de movimentos respiratórios.

- 32 Considerando os efeitos colaterais apresentados pelo paciente com insuficiência renal crônica durante a hemodiálise, pode-se afirmar que
- a dor torácica é devida ao aumento de gás carbônico na circulação extracorpórea do sangue.
 - a hipovolemia ocorre pelo aumento das toxinas urêmicas circulantes.
 - a embolia gasosa, embora rara, pode ocorrer, se houver saída de ar no sistema vascular do paciente.
 - as câibras musculares podem ocorrer em virtude da eliminação rápida dos líquidos e eletrólitos como sódio e potássio.
 - a hipovolemia é o acúmulo de líquido no organismo, caracterizada pelo aumento de peso e de hipertensão arterial.
- 33 Quanto às regiões para aplicação de medicamentos via intramuscular, pode-se dizer que
- a região da face ântero-lateral da coxa (FALC) é indicada para crianças menores de 28 dias e contraindicada para lactentes e crianças de até 10 anos.
 - a região dorso-glútea (DG) é a mais indicada para crianças menores de dois anos e idosos.
 - a região ventro-glútea (VG) ou Hochstetter é indicada para aplicação intramuscular em todas as idades.
 - a região deltoidiana (D) tem como contraindicação adultos com pequeno desenvolvimento muscular e crianças maiores de 10 anos.
 - na região ventro-glútea (VG) ou Hochstetter, no músculo glúteo médio, pode ser aplicado um volume máximo de 7 ml.
- 34 Sobre paciente com intercorrências do sistema glandular, é correto afirmar que
- a lipodistrofia é um efeito colateral da aplicação frequente de insulina, num mesmo local.
 - a cetoacidose ocorre por excesso de insulina no sangue.
 - a hipoglicemia ocorre pela presença de infecção e pela falta de insulina.
 - a polidipsia é o aumento da fome no diabético.
 - a diabetes tipo I (insulino-dependente) é aquela em que há pouca produção de insulina, podendo ser controlada por dieta e exercício físico.
- 35 São cuidados básicos de enfermagem ao paciente grave internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), EXCETO
- Lavar as mãos antes e após a realização de procedimentos e cuidados.
 - Verificar os sinais vitais e Pressão Venosa Central (PVC) exclusivamente de 3 em 3 horas.
 - Trocar as traqueias a cada 48 ou 72 horas e a água do respirador diariamente.
 - Relatar as ocorrências, a evolução do paciente, a situação das infusões e das eliminações a cada passagem de plantão.
 - Aspirar as secreções traqueais, nasais e orais, sempre que necessário, registrando quantidade, cor e aspecto das mesmas.

- 36 Ao admitir o paciente na unidade cirúrgica, após alta da unidade de recuperação anestésica, os cuidados imediatos incluem, EXCETO
- Avaliar a respiração e administrar oxigênio quando prescrito.
 - Monitorar os sinais vitais e observar o calor, umidade e coloração da pele.
 - Avaliar o sítio cirúrgico e os sistemas de drenagem da ferida.
 - Avaliar o nível de consciência, orientação e capacidade de mover os membros.
 - Administrar o medicamento pré-anestésico quando prescrito.
-
- 37 Considerando as queimaduras e sua profundidade, pode-se afirmar que, na queimadura de 2º grau, há envolvimento
- da epiderme e possivelmente de uma porção da derme com edema mínimo ou ausente.
 - da epiderme, de toda a derme e por vezes do tecido subcutâneo, podendo envolver o tecido conjuntivo, músculo e osso.
 - da epiderme, da parte superior da derme e de sua porção mais profunda, com presença de dor, edema e sensibilidade ao ar frio.
 - da epiderme, sem dor, podendo ocorrer hematúria e hemólise.
 - somente da epiderme que se apresenta seca, com a pele rompida e exposição do tecido adiposo.
-
- 38 Quanto às lesões cutâneas, pode-se afirmar que
- mácula é a mudança da coloração da pele, plana e impalpável, com borda circunscrita, medindo menos que 1 cm de diâmetro.
 - equimose é uma lesão macular arredondada ou irregular, associada ao trauma com tendências hemorrágicas e maior que a petéquia.
 - pápula é uma vesícula ou bolha cheia de pus.
 - cisto é uma massa sólida elevada e palpável de até 2 cm e com borda circunscrita.
- Estão corretas
- apenas I e II.
 - apenas III e IV.
 - apenas II e III.
 - apenas I e III.
 - apenas I e IV.
-
- 39 Considerando a abordagem primária completa no atendimento inicial à vítima de trauma, têm-se as etapas dos ABC's, na qual o "A" significa
- respiração.
 - circulação com controle de hemorragias.
 - exposição da vítima.
 - vias aéreas com controle cervical.
 - estado neurológico.

40 Considerando o processo fisiológico feminino, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Amenorréia | () Parte superior da vagina |
| 2) Endométrio | () Mucosa que reveste o útero |
| 3) Menarca | () Ausência de fluxo menstrual |
| 4) Fórnice | () Estrutura cística que se desenvolve no ovário quando começa a ovulação |
| 5) Folículo de Graaf | () Início da função menstrual |

A sequência correta é

- 5 - 2 - 1 - 4 - 3.
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
- 3 - 5 - 1 - 4 - 2.
- 2 - 4 - 3 - 1 - 5.
- 4 - 2 - 1 - 5 - 3.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CONCURSO PÚBLICO 2009
Edital nº 001/2009-PRRH
GABARITO OFICIAL

ECONOMISTA	
Questões	Alternativas
01	B
02	ANULADA
03	E
04	C
05	C
06	D
07	A
08	A
09	B
10	D
11	E
12	A
13	C
14	B
15	A
16	D
17	B
18	D
19	C
20	A
21	E
22	B
23	A
24	C
25	B
26	D
27	A
28	E
29	B
30	D
31	C
32	E
33	A
34	D
35	C
36	D
37	ANULADA
38	A
39	C
40	E

ENFERMEIRO	
Questões	Alternativas
01	ANULADA
02	A
03	A
04	E
05	D
06	C
07	B
08	E
09	C
10	A
11	D
12	B
13	E
14	C
15	D
16	C
17	A
18	ANULADA
19	C
20	B
21	B
22	D
23	A
24	E
25	D
26	C
27	A
28	B
29	E
30	D
31	B
32	D
33	C
34	A
35	B
36	E
37	C
38	A
39	D
40	E

Santa Maria, 19 de maio de 2009
Pró-Reitoria de Recursos Humanos