


FOLHETO
COLETÂNEA
6796

FOLHETO COLETÂNEA 6796

CONCURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estar aqui também!



BC
E08935

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

U F S M
Biblioteca Central

Nº INSCRIÇÃO

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NOME DO CANDIDATO

<input type="text"/>

CARGO

MÉDICO/ PSIQUIATRIA

E 08935

NTIA

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPERVES**
UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Médico/ Psiquiatria

01. A Interconsulta Psiquiátrica é um processo complexo de atendimento psiquiátrico, com características próprias. Assinale a alternativa que apresenta 3 características desse método de atenção psiquiátrica.

- a) Urgência, foco na tríade Paciente/Médico-assistente/ Psiquiatra, interconsultor inserido na instituição.
- b) Diagnóstico situacional, foco no paciente e sua família, interconsultor não necessariamente inserido na instituição.
- c) Diagnóstico situacional, foco na tríade Médico-assistente/ Relação Médico - Paciente ou Equipe/ Paciente, interconsultor inserido na instituição.
- d) Diagnóstico situacional, foco de atuação no paciente e sua família, interconsultor deve ter função de ensino, pesquisa e extensão.
- e) Urgência, foco na equipe assistencial, interconsultor inserido na instituição.

03. Os transtornos de personalidade (TP), nos contextos clínicos, apresentam uma prevalência de até 50% dos pacientes psiquiátricos. Por isso, é muito importante seu diagnóstico. Indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.

- () Conforme o DSM-IV, os TP são reunidos em 3 grupos: A, B, C, contendo 10 tipos específicos de patologias, Mas, além desses, o DSM-IV ainda inclui, em seu apêndice, dois outros tipos: passivo-agressivo e o depressivo.
- () O TP anti-social está diretamente relacionado ao fato de viver em comunidades com alta criminalidade.
- () Os pacientes com TP esquizotípica têm uma associação genética com a esquizofrenia.
- () Alguns pesquisadores especulam que os TP Borderline e anti-social podem ser a mesma doença, com manifestações diferentes, levando em consideração o sexo masculino e feminino.

A seqüência correta é:

- a) V - F - V - V.
- b) F - F - V - V.
- c) F - V - F - F.
- d) V - V - F - F.
- e) F - V - V - V.

02. Qual dos seguintes sintomas de Esquizofrenia responde melhor a tratamento farmacológico?

- a) Anedomia.
- b) Idéias delirantes.
- c) Alucinações auditivas.
- d) Apatia.
- e) Embotamento afetivo.

04. É difícil prever se o primeiro episódio depressivo maior, em uma pessoa jovem, evoluirá para um Transtorno Afetivo Bipolar (TAB). Algumas características sugestivas dessa evolução são:

- a) Aparecimento agudo de quadro intenso com insônia intermediária ou terminal.
- b) Aparecimento agudo de quadro intenso com risco de suicídio.
- c) Aparecimento gradual de depressão com ansiedade intensa.
- d) Aparecimento agudo de quadro intenso com lentificação psicomotora e aspectos psicóticos.
- e) Aparecimento gradual de intensa depressão com aspectos psicóticos.

05. Em relação à Síndrome de Abstinência do Álcool, é correto afirmar:

- a) A gravidade do quadro não depende diretamente do tempo e da intensidade do uso de álcool.
- b) Somente ocorre algumas horas após a parada do consumo de álcool.
- c) Pode apresentar-se com episódios convulsivos e quadros confusionais.
- d) Raramente apresenta estágio inicial com tremores, irritabilidade, náuseas e vômitos.
- e) Os BZD são contra-indicados no tratamento dessa Síndrome, devido ao comprometimento hepático comum nesses pacientes.

06. Quando, num ensaio clínico com antidepressivos, o paciente experimenta pelo menos 50% de redução dos sintomas depressivos, avaliados por meio de uma escala padronizada, como a escala de Hamilton (HAM-D), considera-se que ocorreu

- a) remissão.
- b) recuperação.
- c) remissão incompleta.
- d) resposta.
- e) manutenção.

07. Qual das manifestações é essencial no diagnóstico diferencial entre Transtorno de Personalidade Esquizóide e Transtorno de Personalidade Esquizotípica, conforme DSM-IV?

- a) Padrão generalizado de distanciamento social e interpessoal.
- b) Indiferença afetiva.
- c) Desinteresse por relacionamentos íntimos (sexuais).
- d) Crenças ou discursos bizarros com pensamentos mágicos.
- e) Indiferença a elogios ou críticas.

08. A pseudologia fantástica caracteriza-se por

- a) modificação induzida de consciência.
- b) crença na realidade de suas fantasias.
- c) falsa crença, absurda, totalmente implausível.
- d) teste de realidade comprometido, com criação de uma nova realidade.
- e) uma sensação de distanciamento de si mesmo.

09. O setor de psiquiatria do hospital recebeu um pedido de interconsulta da seguinte forma:

“Paciente de 16 anos, com diabete insulino-dependente e tumor hepático, em fase terminal. Solicitamos avaliação e conduta”.

O psiquiatra avaliou a situação e constatou tratar-se de um paciente internado há bastante tempo, muito querido de todos da equipe de assistência. Suas condições clínicas eram realmente muito delicadas, corria risco de vida, mas estava calmo. Como o natal se aproxima a questão é: Dar licença para passar o natal em casa e correr o risco de que o paciente morra, ou mantê-lo no hospital com a enfermaria deserta neste período?

Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais acertada, levando em consideração os objetivos do tratamento em interconsulta psiquiátrica.

- a) Daria a licença, já que o paciente é terminal e poderia aproveitar alguns dias melhores em sua vida, com os familiares.
- b) Manteria o paciente no hospital e providenciaria cuidados da Assistência Social, no sentido de apoiá-lo nesse período em que a equipe não estaria junto.
- c) Consultaria a família do paciente para decidir melhor.
- d) Consultaria o próprio paciente para conhecer seu desejo.
- e) Realizaria reunião com a equipe de assistência e médico assistente com objetivo de auxiliar na decisão.

10. Fármaco indicado no episódio depressivo do Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), por induzir menos “virada maníaca”.

- a) Imipramina.
- b) Amitriptilina.
- c) Bupropiona.
- d) Fluoxetina.
- e) Clomipramina.

11. Segundo Kernberg, o conceito de Organização Borderline da Personalidade é mais útil para a clínica do que o de Transtorno de Personalidade Borderline do DSM-IV, por ser, também, estrutural além de descriptivo.

Em quais critérios se baseia o diagnóstico da Organização Borderline da Personalidade?

- I. Padrão de relações interpessoais instáveis e intensas com alterações de extremos de supervalorização e desvalorização.
- II. Difusão de identidade, capacidade de teste da realidade e nível de operações defensivas.
- III. Impulsividade e instabilidade afetiva.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II e III.

13. O álcool é a substância psicoativa mais utilizada em nossa sociedade, por isso, as complicações relacionadas ao seu uso são comuns nas salas de urgência. Referente a esse assunto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) para cada afirmativa a seguir.

- () As intoxicações agudas pelo álcool, provocam alterações do comportamento, afeto, pensamento e psicomotricidade.
- () As intoxicações agudas pelo álcool são passageiras. O organismo metaboliza cerca de 15 mg% de álcool/h.
- () Entre 600 e 800 mg%, a intoxicação alcoólica é freqüentemente fatal.
- () É sempre importante fazer reposição de glicose, administrando 1 amp. de tiamina 100 mg 30 minutos antes deste procedimento.

A seqüência correta é:

- a) V - F - V - F.
- b) F - V - F - F.
- c) V - F - F - V.
- d) F - F - F - V.
- e) V - V - V - F.

12. Em relação aos pacientes com Transtorno de Somatização, considere as afirmações:

- I. Acreditam-se mais incapacitados do que as evidências objetivas indicam.
- II. Obtêm melhora significativa quando o médico lhes explica que "é tudo da sua cabeça".
- III. Através dos sintomas físicos, tentam comunicar sofrimento psicológico.
- IV. Produzem, intencionalmente, os sintomas, com a finalidade de obter algum tipo de vantagem.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

14. Os corpos celulares dos neurônios serotoninérgicos, localizados na região do tronco cerebral, denominada núcleo da rafe, possuem projeções para outros locais do cérebro. Considerando as projeções serotoninérgicas, analise as afirmações a seguir.

- I. Da rafe ao córtex frontal, podem ser importantes na regulação do humor.
- II. Da rafe ao hipotálamo, parecem regular os movimentos, bem como obsessões e compulsões.
- III. Da rafe às áreas límbicas, parecem estar envolvidas na ansiedade e no pânico.
- IV. Da rafe aos gânglios da base, parecem regular o apetite e o comportamento alimentar.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

15. Segundo estudos realizados no Hospital de Clínicas da UNICAMP, de uma prevalência de 300 a 450 casos psiquiátricos/ 1.000 pacientes internados em hospital geral, somente 20 interconsultas psiquiátricas foram realizadas. A respeito de fatores relacionados às causas desse fenômeno, associe verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas.

- () Baixo reconhecimento dos transtornos mentais.
- () Desconfiança dos médicos clínicos em relação aos tratamentos psiquiátricos.
- () As intercorrências psiquiátricas mais encaminhadas são tentativas de suicídio e psicoses agudas, que acontecem com pouca freqüência em hospital geral.
- () Existência de preconceitos em relação ao doente psiquiátrico.

A seqüência correta é:

- a) F - V - F - V.
- b) V - F - V - F.
- c) V - F - F - V.
- d) V - V - V - V.
- e) F - V - F - F.

16. Um indivíduo acredita que extraterrestres, comandados por George Bush, retiraram seus órgãos internos e implantaram um "chip" na sua cavidade abdominal. Desde então, ele não consegue mais dar ordens aos computadores do Pentágono. Ele "entendeu tudo" quando assistiu ao Jornal Nacional na televisão.

São delírios contidos nessa "vinheta clínica":

- I. Delírio bizarro
- II. Delírio de referência
- III. Delírio persecutório
- IV. Delírio de influência

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

17. O suicídio é um importante problema de saúde pública. Em relação a sua epidemiologia, identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmativas a seguir.

- () Enquanto a incidência anual de suicídio no mundo é de 10-20/ 100.000 habitantes, as taxas de tentativas de suicídio são 15 vezes mais altas.
- () No Brasil, a prevalência de suicídios é de 4 a 6/100.000 habitantes.
- () A intoxicação por fármacos é o método mais utilizado no Brasil, por homens e mulheres, para o suicídio.
- () A relação homens/mulheres para tentativa de suicídio e suicídios consumados é 4:1 e 1:4, respectivamente.

A seqüência correta é:

- a) V - V - F - F.
- b) V - F - V - F.
- c) V - V - F - V.
- d) F - F - F - V.
- e) F - V - V - F.

18. Pode-se fazer o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), nos seguintes casos:

- I. Depressões recorrentes e uma história de mania.
- II. Mania atual sem uma história de episódios depressivos.
- III. Mania atual e uma história de um episódio depressivo.
- IV. Depressões recorrentes sem uma história de mania.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

19. Assinale a afirmativa correta em relação ao Transtorno de Personalidade Obsessivo-Compulsivo (TPOC).

- a) A maioria dos pacientes com esse transtorno evolui para Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) do Eixo I.
- b) A autocritica e a vida emocional estéril desses pacientes os tornam vulneráveis a depressões de início tardio.
- c) Medicamentos AD como os ISRS e a Clomipramina têm eficácia comprovada no tratamento do TP Obsessivo-Compulsivo.
- d) A prevalência de TPOC é muito alta, já que seus traços são considerados desejáveis e bem aceitos aos invés de problemáticos.
- e) A diferenciação entre TPOC e TOC está, especialmente, na existência de rituais compulsivos no TOC que não existem no TPOC.

20. A Discinesia Tardia (DT) é um efeito tardio dos antipsicóticos típicos.

Em relação a DT, considere as afirmativas.

- I. Os movimentos periorais (torção e protusão da língua, movimentos de mastigação) são os mais comuns.
 - II. É exacerbada logo que o antipsicótico é diminuído.
 - III. Desaparece durante o sono.
 - IV. As mulheres são mais afetadas do que os homens.
- Está(ão) correta(s)
- a) apenas I, II e III.
 - b) apenas I e III.
 - c) apenas II e IV.
 - d) apenas IV.
 - e) I, II, III e IV.

21. Qual dos tipos de Transtorno de Personalidade relacionados, possui melhor prognóstico?

- a) TP Borderline.
- b) TP Esquiva.
- c) TP Narcisista.
- d) TP Obsessivo-Compulsiva.
- e) TP Histrionica.

22. Em relação à Esquizofrenia, considere as seguintes afirmações:

- I. Tem prevalência ao longo da vida em torno de 1% e é de ocorrência universal.
- II. Costuma iniciar no final da adolescência e início da vida adulta e é mais precoce nos homens.
- III. Em gêmeos monozigóticos há uma concordância de 40 - 50%.
- IV. Predomínio de sintomas negativos indicam um melhor prognóstico.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

Analise a situação proposta para responder às questões de números 23, 24 e 25.

Paciente de 15 anos de idade, solteira, G1, PO. Internada com gravidez a termo, evolui para parto normal, sem intercorrências. No 2º dia de puerpério, apresenta quadro confusional, com desorientação no tempo e espaço, diminuição da memória e atenção. No outro dia, apertava o filho no colo dizendo que estava morto. Queria fugir do hospital. No 4º dia, não falava com ninguém, não se cuidava, isolada.

Sem antecedente pessoal de patologia mental. Irmão alcoolista, mãe com internações psiquiátricas. Segundo a tia, a paciente engravidara sem desejar e fora abandonada pelo namorado.

23. Qual o diagnóstico mais adequado ao caso?

- a) Psicose Puerperal.
- b) Depressão Puerperal.
- c) Blues Puerperal.
- d) Transtorno Afetivo Bipolar (1º episódio).
- e) Transtorno Psicótico Agudo com etiologia a esclarecer.

24. O que deve ser levado em consideração para o diagnóstico diferencial, na situação descrita?

- I. Tireoideopatias e infecções.
- II. Evolução do quadro.
- III. Uso de AD para teste de resposta terapêutica.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II e III.

25. Considerando o tratamento desse caso, identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações a seguir.

- () A internação em unidade psiquiátrica, afastada do filho, se impõe, pelo risco de filicídio.
- () O tratamento com AP (antipsicóticos) não deve ser prolongado.
- () A amamentação deve ser interrompida devido ao risco de dano ao bebê pelo uso de psicotrópicos.

A seqüência correta é

- a) F - V - F.
- b) V - V - F.
- c) V - F - V.
- d) F - V - V.
- e) F - F - V.

Responda às questões de números 26 e 27, considerando a situação proposta.

Maria, 22 anos, é admitida no HUSM devido à anestesia da mão direita que se desenvolveu após uma discussão com seu irmão. Ela está bem disposta e parece despreocupada quanto ao seu problema. Não há história de trauma físico. O exame neurológico é negativo, exceto pela sensibilidade à dor diminuída em uma distribuição de luva sobre a mão direita. Sua família inteira está presente, expressando grande preocupação e atenção. Ela ignora seu irmão e parece alheia ao ciúme e à rivalidade crônicos descritos por sua família.

26. O diagnóstico mais provável é

- a) Transtorno Dismórfico Corporal.
- b) Transtorno de Personalidade Histrionica.
- c) Transtorno de Conversão.
- d) Transtorno de Somatização.
- e) Hipocondria.

27. Nessa paciente, a ausência de ansiedade associada à sua falta de percepção do conflito psicológico com seu irmão é, mais provavelmente, devido à(ao)

- a) reação de indiferença.
- b) simulação.
- c) histeria.
- d) ganho primário.
- e) ganho secundário.

28. Em relação ao Transtorno do Pânico, considere as afirmações a seguir.

- I. Costuma iniciar no começo da vida adulta.
- II. Ocorre mais freqüentemente no sexo feminino.
- III. Benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos e ISRS mostram-se eficazes no tratamento.
- IV. Para o diagnóstico, é necessário que ocorram ataques espontâneos.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

29. Considerando os aspectos biológicos do suicídio, pode-se afirmar:

- I. Atualmente sabe-se que o comportamento suicida tem determinação neurobiológica independente a doença psiquiátrica de base.
- II. Estudos têm demonstrando que a função serotoninérgica encontra-se muito aumentada em indivíduos que tentaram suicídio.
- III. Existe uma suscetibilidade genética para o suicídio, mas só se manifestará na presença de estresse intenso ou de doença psiquiátrica.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas I e III.

30. Considere as afirmações sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

- I. É um transtorno crônico.
- II. Tem um pico dos 35 - 45 anos.
- III. Tem alto índice de comorbidades.
- IV. Caracteriza-se por expectativa apreensiva durante, no mínimo, 1 mês.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

31. As doenças psiquiátricas estão fortemente associadas ao suicídio. Relacione os transtornos psiquiátricos mais prevalentes em pacientes suicidas, aos seus respectivos índices.

- 1. Transtorno depressivo e afetivo bipolar
 - 2. Abuso ou dependência de álcool
 - 3. Esquizofrenias
 - 4. Transtorno de personalidade
 - 5. Transtorno cerebral orgânico
- a. 4%
 - b. 20 a 25%
 - c. 9%
 - d. 5 a 10%
 - e. 45 a 70%

A seqüência correta é

- a) 1d - 2a - 3e - 4b - 5c.
- b) 1e - 2b - 3d - 4c - 5a.
- c) 1a - 2b - 3e - 4c - 5d.
- d) 1d - 2e - 3c - 4b - 5a.
- e) 1a - 2d - 3b - 4c - 5e.

32. Considere as afirmações sobre o Transtorno-Obsessivo-Compulsivo (TOC).

- I. Os casos que iniciam na infância predominam no sexo masculino.
- II. Os pacientes sentem suas obsessões ou compulsões como intrusivas e irrationais.
- III. A ansiedade é atenuada quando uma compulsão é realizada.
- IV. O TOC tem sido associado com doença dos gânglios basais.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

33. Considerando a agressividade e agitação psicomotora, nos serviços de urgência, identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmativas a seguir.

- () Transtornos psicóticos como Esquizofrenias, TAB (Transtorno Afetivo Bipolar), Transtorno Delirante Paranóide e Psicose pós-parto, são alguns dos quadros psiquiátricos que mais comumente apresentam agressividade.
- () Entre os fatores de risco para comportamento agressivo encontra-se sexo feminino, jovem, com tendência ao uso de projeção e dissociação.
- () O comportamento do paciente, durante a entrevista, é melhor preditor de violência iminente.
- () Algumas patologias orgânicas como abuso de substâncias, epilepsias e patologias sistêmicas, estão intimamente relacionadas ao comportamento violento.

A seqüência correta é

- a) F - V - F - V.
- b) V - F - F - F.
- c) V - F - V - V.
- d) F - V - V - V.
- e) V - F - V - F.

34. São fatores predisponentes para o início de fobias específicas:

- I. Eventos traumáticos (p ex. ficar preso num armário).
- II. Observação de outros demonstrando temor (p ex. observar a mãe com medo de baratas).
- III. Transmissão de informações (p ex. alertas parentais repetidos sobre perigos de certos animais).
- IV. Sexo masculino.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e III.
- b) apenas I, II e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

35. Paciente apresenta os seguintes sinais e sintomas de intoxicação por drogas ilícitas:

Euforia inicial com sedação e sonolência posterior, sensação de lentificação do tempo, distorções auditivas e visuais, deterioração do juízo crítico, incoordenação motora, distúrbio da atenção e memória, conjuntivas hiperemias, taquicardia, aumento do apetite, ansiedade.

A provável droga causadora da intoxicação é

- a) alucinógeno.
- b) maconha.
- c) opióide.
- d) cocaína.
- e) anfetamina.

36. Os antipsicóticos, ao bloquearem os receptores D2, nas diferentes vias dopaminérgicas, causam:

- I. Na via nigroestriatal: distúrbios do movimento.
- II. Na via mesocortical: aumento dos sintomas negativos.
- III. Na via mesolímica: diminuição dos sintomas positivos.
- IV. Na via tuberoinfundibular: aumento dos níveis de prolactina.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

37. O *Delirium* é consequência fisiológica direta de uma condição médica geral, intoxicação ou abstinência de substâncias, uso de medicação, exposição e toxinas ou uma combinação desses fatores.

Considere as afirmativas como verdadeira (V) ou falsa (F) em relação ao *Delirium*.

- () A prevalência de *Delirium* em paciente hospitalar varia de 10 a 30%. Nos períodos pós-operatório, é cerca de 51% e, em doentes terminais, chega a 80% próximo da morte.
- () As alucinações mais comuns são auditivas, tátteis e olfativas.
- () Os BZD podem exacerbar os sintomas de *Delirium*, por isso, são francamente contra-indicados no seu tratamento.

A seqüência correta é:

- a) V - F - F.
- b) F - F - F.
- c) V - V - F.
- d) V - V - V.
- e) F - V - V.

38. Considere as afirmações sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB).

- I. O intervalo entre os episódios tendem a aumentar com a idade.
- II. O Transtorno Afetivo Bipolar I é um transtorno recorrente.
- III. Os pacientes geralmente apresentam afrouxamento de associações durante os episódios maníacos.
- IV. A ciclagem rápida é mais comum em mulheres.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

39. Espera-se que todo plantonista de um serviço de urgência em Psiquiatria conheça os trâmites éticos-legais e sociais que envolvem esse assunto. Por isso, relate as colunas.

1. Internação involuntária.
 2. Internação necessária, mas paciente e família não concordam.
 3. Internação por mandato judicial.
 4. Paciente com risco e desacompanhado.
 5. Internação necessária, mas com ausência de leitos.
- a) Internar o paciente.
- Comunicar ao MP (Ministério Público).
 - Registrar no prontuário.
 - Elaborar TR (termo de responsabilidade para familiar assinar).
- b) Internar o paciente.
- Comunicar o MP.
 - Acionar o SS (Serviço Social).
 - Registrar no prontuário.
- c) • Entrar em contato com outro serviço de urgência Psiquiátrica.
- Encaminhar o paciente com responsável legal.
 - Registrar no prontuário.
- d) • Observar a comarca.
- Internar sempre que possível.
- e) • Avaliar cautelosamente os riscos.
- Comunicar, em 24 horas, o MP.
 - Se o paciente for menor de idade, obter autorização da Justiça da Infância e da Juventude.

A seqüência correta é

- a) 1e - 2a - 3d - 4b - 5c.
- b) 1a - 2c - 3e - 4b - 5d.
- c) 1c - 2a - 3b - 4e - 5d.
- d) 1e - 2b - 3d - 4c - 5a.
- e) 1d - 2a - 3c - 4e - 5b.

40. São dinâmicas familiares que favorecem à somatização:

- I. Pais que respondem mais prontamente a queixas físicas.
- II. Pais que transmitem, veladamente, mensagens contra a expressão de afeto.
- III. O papel de doente que libera das obrigações normais e legitima a dependência.


IV. Famílias que costumam verbalizar sentimentos.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CONCURSO PÚBLICO 2003 – HUSM

26/10/2003



019
CONCURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estar aqui, também!

Medico/ Psiquiatria			
01	C	21	D
02	C	22	A
03	A	23	E
04	D	24	D
05	C	25	A
06	D	26	C
07	D	27	D
08	B	28	E
09	E	29	E
10	C	30	A
11	B	31	B
12	B	32	E
13	E	33	C
14	B	34	B
15	D	35	B
16	E	36	E
17	A	37	A
18	A	38	C
19	B	39	A
20	E	40	A

Visto:

Dario Trevisan de Almeida,
Presidente da COPERVES.