

FOLHETO
COLETÂNEA
6799

CONCURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estar aqui, também!

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

UFSM
Biblioteca Central



BC
E08941

Nº INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

NOME DO CANDIDATO

--

CARGO

NUTRICIONISTA

E08941

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPERVES**
UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Nutricionista

01. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas que se referem à conceituação de organização e empresa em Unidade de Alimentação e Nutrição.

- () Organização envolve a noção de empreendimento.
- () O conceito que melhor define organização é: comportamento dos indivíduos que participam de um sistema.
- () Construção do duplo organismo social e material da empresa não pode ser conceituado como organização.

A sequência correta é

- a) V - V - F.
- b) F - F - V.
- c) V - F - F.
- d) F - F - F.
- e) V - V - V.

02. Assinale a alternativa que NÃO apresenta funções administrativas em uma Unidade de Alimentação e Nutrição.

- a) Planejamento.
- b) Coordenação.
- c) Atividades financeiras.
- d) Direção.
- e) Controle.

03. Correlacione as colunas.

- 1. Recurso Humano
- 2. Prazo
- 3. Instalação
- 4. Equipamento
- 5. Matéria-Prima

- () Analisar as relações com a estrutura de organização vigente, suas habilidades e conhecimentos.
- () Deve receber cuidados específicos para eliminar os desperdícios ou possibilitar melhor aproveitamento.
- () Deve ser feito planejamento sobre a melhor forma de utilizá-lo.
- () Deste insumo, deverão ser considerados relevantes a adequação e a capacidade de manutenção.
- () Devem ser considerados os níveis de iluminação, ruído, temperatura, ventilação e segurança.

A sequência correta é

- a) 5 - 3 - 1 - 4 - 2.
- b) 3 - 2 - 4 - 5 - 1.
- c) 1 - 5 - 2 - 4 - 3.
- d) 4 - 5 - 3 - 2 - 1.
- e) 1 - 5 - 4 - 2 - 3.

04. Considerando as teorias administrativas, é INCORRETO afirmar que

- a) a teoria estruturalista vê a organização como uma unidade social, grande e complexa. O poder é considerado legítimo.
- b) a função administrativa consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
- c) a função contábil é responsável pelos inventários, balanços, custos e estatísticas.
- d) a segurança dos comensais, segurança pessoal e segurança dos equipamentos fazem parte da função técnica.
- e) as atividades relativas à previsão, requisição, seleção, compra, conferência, recebimento e distribuição fazem parte da função comercial.

chamada: FOLHETO COLETANEA 67
cod barras: E08941
local: BC
inclusão: 19/9/2008
n controle: 00036462

05. Considere as seguintes afirmações:

- I. O planejamento estratégico deve fixar os objetivos quanto às metas, aos meios, aos recursos, à implantação e ao controle.
- II. O layout deve ser esboçado por nutricionistas de acordo com os dados fornecidos pela equipe de planejamento.
- III. A determinação do sistema de distribuição de refeições aos pacientes estabelece três refeições sendo: desjejum, almoço e jantar.

Está(ão) INCORRETA(S)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II.
- e) apenas III.

06. Considerando as instalações físicas e o transporte de alimentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A portaria do centro de vigilância sanitária número 10, de março de 1999, determina que: nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo, embalagens ou recipientes abertos.
- b) O pé direito normal é de 3m no térreo e 2,7m nos andares superiores.
- c) A área de pré-preparo e preparo subdivide-se em: preparação de carnes, preparação de frutas e verduras, preparação de massas e sobremesas.
- d) O transporte de refeições prontas para consumo deve obedecer às seguintes temperaturas: sob refrigeração, 7°C não ultrapassando os 10°C; sob aquecimento, acima de 60°C com tolerância de 55°C.
- e) Os ralos devem ser sifonados para impedir a entrada de roedores e devem possuir grelhas com proteção telada ou outro dispositivo adequado.

17. Assinale a alternativa que NÃO define sistema PCCs (Pontos Críticos de Controle).

- a) Limite crítico, se refere ao valor utilizado como critério.
- b) O risco indica probabilidade estimada da ocorrência dos perigos.
- c) O ato de medir ou observar por meio de instrumentos faz parte do operacional.
- d) A ação corretiva é imediata e indica que um critério não está sendo atingido.
- e) O desvio indica falha ou não-alcance do limite crítico.

08. Quando há boas práticas de higiene e limpeza em uma Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar, pode-se evitar gastrites. Os microrganismos relacionados são causadores de gastrites, EXCETO

- a) *Bacillus cereus* (clássico).
- b) *Salmonella*.
- c) *Clostridium perfringens*.
- d) *Lactobacillus*.
- e) *Escherichia coli*.

09. Indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.

- () O tipo de hospital, de construção, de paciente, número de refeições, padrão de atendimento, sistema de distribuição de refeições, jornada de trabalho são fatores que interferem no dimensionamento do pessoal em uma Unidade de Alimentação e Nutrição.
- () Uma Unidade de Alimentação e Nutrição de médio porte deve ser formada pelos seguintes profissionais: nutricionista, lactarista, despenseiro, copeiro e demais funcionários necessários à produção de alimentos.
- () Em um hospital com 200 leitos, 15% da área da Unidade de Alimentação e Nutrição é ocupada pela administração; 8% na estocagem; 11% no preparo de gêneros; 20% na cocção; 5% na merenda, lanche e desjejum; 7% na cafeteria; 2% copas e distribuição; 8% lavagem de louça e faxina; 6% serviço noturno.

A sequência correta é

- a) V - V - V.
- b) F - V - V.
- c) V - F - V.
- d) F - V - F.
- e) F - F - F.

10. A eficiência de um lactário dependerá da correta localização no hospital. No que se refere ao planejamento do lactário, qual afirmativa NÃO está de acordo com o ideal?

- a) A localização deve ser feita contemplando os seguintes critérios: maior afastamento possível das áreas de casos infectocontagiosos; maior afastamento possível das áreas de circulação de pessoal; proximidade do berçário; maior proximidade possível do serviço de alimentação; máxima proteção contra contaminação do ar.
- b) A distribuição da área disponível do lactário é calculada aproximadamente 0,60m²/berço ou leito de pediatria.
- c) O lactário consiste, basicamente, em três salas: uma sala de limpeza, uma sala de preparo, uma ante-sala para higiene, troca de roupa dos funcionários e onde serão realizadas as atividades administrativas do lactário.
- d) A distribuição da área disponível do lactário, poderá ser feita da seguinte maneira:
 - 30% da área disponível, para a sala de limpeza;
 - 50% da área disponível, para a sala de preparo;
 - 20% da área disponível, para ante-sala.
- e) A ventilação do lactário deve preencher os seguintes requisitos:
 - suprimento de ar bacteriologicamente puro;
 - suficiente troca de ar;
 - condições de trabalho e conforto para os funcionários (temperatura, umidade e circulação do ar).

11. Considere as seguintes afirmativas sobre banco de leite humano.

- I. Não se deve considerar como banco de leite humano as maternidades e hospitais, onde as doadoras são mantidas em regime de internação e o leite é distribuído sem o devido tratamento e controle.
- II. O banco de leite tipo brasileiro se caracteriza pela coleta de leite a domicílio. O número de doadoras deve ser proporcional à demanda e o seu tratamento exige atualização constante.
- III. A finalidade do teste bacteriológico é detectar possíveis falhas na técnica de limpeza, preparo e esterilização. Contagem maior de 25 microrganismos/ml implica a revisão cuidadosa de todo o processo.
- IV. A clientela de um banco de leite humano deve ser, prioritariamente, constituída por crianças de até três meses de idade.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.
- e) apenas I, III e IV.

12. No que se refere à suplementação nutricional em sepse, é INCORRETO afirmar que

- a) os aminoácidos condicionalmente essenciais que devem ser suplementados são arginina e glutamina.
- b) os agentes antioxidantes: vitamina C, E, β -caroteno e selênio deverão ser suplementados.
- c) a alanina é substrato mais importante que glutamina e arginina e irá ter uma ação direta para gliconeogênese e ureiagênese hepáticas, portanto sua suplementação é de grande importância no paciente com sepse.
- d) a vitamina B₁, ministrada em quantidades maiores que a recomendação, atuará como agente estimulante metabólico.
- e) o α -cetoglutarato de arginina será um agente de facilitação metabólica.

13. A terapia nutricional enteral terá maior êxito em algumas patologias, quando a alimentação oral não for possível. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas que se referem à nutrição enteral.

- () O método de escolha para aporte nutricional no paciente séptico é a nutrição enteral via tubo digestivo, pois diminui a agressão direta, reduz morbidade séptica sistêmica.
- () Íleo paralítico ou adenômico, a diarreia e a distensão abdominal são fatores limitantes para utilização da terapia nutricional enteral.
- () Para nutrição enteral, a gordura mais favorável é a emulsão com mistura física contendo 50% de triglicerídeos de cadeia longa e 50% de triglicerídeos de cadeia média.

A sequência correta é

- a) F - V - F.
- b) V - F - V.
- c) F - F - V.
- d) V - V - F.
- e) V - V - V.

14. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere a doenças cardiovasculares.

- a) O limite de colesterol total e LDL colesterol em crianças, como fator de prevenção, deve ser menor que 170 mg/dL e 110mg/dL, respectivamente.
- b) Tanto o diabetes insulino-dependente como o diabetes não-insulino-dependente aumentam os fatores de risco para doenças cardiovasculares.
- c) O aumento de lipídios sangüíneos está diretamente ligado à ingestão dos ácidos graxos, vindos da alimentação. Portanto, a recomendação atual, como fator curativo e preventivo deve obedecer às seguintes medidas: ácidos graxos saturados até 7%, ácidos graxos monossaturados até 15% e o restante de ácidos graxos poliinsaturados.
- d) Nas cirurgias de derivação arterial coronária, a terapia nutricional mais adequada é a dieta passo I.
- e) A dieta passo II para tratamento deve ter até 7% de ácidos graxos saturados e até 200 mg de colesterol no total do valor calórico total diário.

15. Quanto à terapia nutricional na insuficiência renal crônica (IRC), no período pré-dialítico, é correto afirmar:

- a) A proteína deve ser oferecida em quantidade liberada, associada a um limite de ingestão de 1 - 1,2 g/dia de fósforo e 300 mg/dia de cálcio.
- b) A ingestão protéica é de 0,6 a 0,8 g/kg de peso/dia com sódio variável, usualmente 2 a 3 g/dia, potássio liberado e fósforo limitado a 1 - 1,2 g/dia.
- c) A ingestão protéica é de 0,6 a 0,8 g/kg de peso/dia com sódio e potássio limitados a 1 g/dia.
- d) A ingestão protéica é de 1 - 1,2 g/kg de peso/dia com sódio e potássio na faixa de 2 - 3 g/dia e potássio de 1 - 1,2 g/dia.
- e) A ingestão protéica é de 0,6 a 0,8 g/kg de peso/dia, sódio variável de 2 - 3 g/dia, potássio restrito a 1 g/dia e fósforo de 1 - 1,2 g/dia.

16. Nas doenças respiratórias, a terapia nutricional deve evitar a desnutrição do tipo marasmática, porque os nutrientes desempenham papel importante. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere aos nutrientes que deverão ser utilizados para evitar esse quadro.

- a) A quantidade de gordura oferecida deve ser de 30 a 50% do total de calorias diárias.
- b) O cálcio e o magnésio em níveis normais são necessários à manutenção normal das estruturas e funções do pulmão.
- c) O enriquecimento da proteína com aminoácidos de cadeia aromática (AACA) pode estimular o drive ventilatório.
- d) O excesso de glicose influencia na produção de gás carbônico (CO₂).
- e) A maioria dos indivíduos com insuficiência respiratória requer uma quantidade total em torno de 1.500 a 2.500 calorias/dia.

17. Considerando o paciente queimado, indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas.

- () A argina é um aminoácido condicionalmente indispensável para manter a homeostase protéica corpórea e a nutrição em pacientes pediátricos gravemente queimados.
- () Uma dieta com baixo teor de gordura diminui a morbidade infecciosa e a estadia hospitalar.
- () A alimentação enteral empregada imediatamente pode ter impacto nutricional e metabólico negativo em queimadura grave.
- () Segundo Curreri, as necessidades calóricas diárias devem ser calculadas usando a seguinte fórmula: $[15 \times \text{peso (kg)}] \times [20 \times \% \text{ área queimada}]$

A sequência correta é

- a) V - V - F - F.
- b) F - V - F - V.
- c) V - V - V - F.
- d) F - F - F - V.
- e) V - F - V - F.

18. A quimioterapia e radioterapia, empregadas no paciente com câncer, pode causar alterações nutricionais importantes. Assinale a questão INCORRETA no que se refere à terapia nutricional adequada.

- a) Dietas ricas em açúcar, geralmente são bem aceitas devido ao aumento do limiar doce.
- b) As proteínas de baixo valor biológico são menos aceitas que as de alto valor biológico.
- c) Quando houver estomatites, alimentos ácidos e condimentados devem ser evitados.
- d) Na presença de má digestão e má absorção, a fórmula deverá ser a mais elementar possível (hidrolisada).
- e) Se houve processo cirúrgico de câncer do trato gastrointestinal, o paciente poderá ficar sem se alimentar nas primeiras 24-48 horas.

19. As dietas são modificadas quanto à consistência, a partir da dieta normal, segundo critérios químicos, organolépticos e físicos.

Indique se é falsa (F) ou verdadeira (V) cada uma das afirmativas a seguir.

- () A dieta branda facilita a digestão, é uma dieta de transição entre as dietas de consistência semi-líquida e líquida completa.
- () Na dieta semi-líquida, é indicado oferecer água, infusos, sucos de carnes e vegetais coados, sopas espessadas (liquidificadas); sorvetes e pudins.
- () A dieta líquida pode apresentar baixo teor nutritivo e causar pouca saciedade.
- () Água e infusos adoçados com açúcar e dextrosol, sucos de frutos coados e caldos de carne e vegetais coados são preparações indicadas na dieta líquida restrita ou cristalina.

A sequência correta é

- a) F - V - V - F.
- b) V - F - F - V.
- c) V - V - F - V.
- d) V - F - V - F.
- e) F - V - V - V.

20. Para análise de consumo de nutrientes, por pacientes, utiliza-se

- a) Inquérito de frequência alimentar.
- b) Registro de 24 horas e registro alimentar de sete dias.
- c) Anamnese alimentar.
- d) Inquérito socioeconômico-cultural.
- e) Anamnese e inquérito de frequência alimentar.

21. NÃO é linha e meta para manejo nutricional do paciente com SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida):

- a) Minimizar a perda de massa corpórea magra e evitar deficiência de micronutrientes.
- b) Orientar alimentação oral é a primeira opção para fornecer uma nutrição adequada, quando não for possível utilizar nutrição enteral.
- c) Utilizar nutrição parenteral somente quando a rota enteral for inviável.
- d) Verificar interferência das drogas na absorção dos nutrientes.
- e) Oferecer megadosas de vitaminas e minerais para melhorar o estado nutricional de pacientes com SIDA.

22. Na dietoterapia da doença celíaca, devem ser excluídos do consumo:

- a) Trigo, cevada, centeio e soja.
- b) Trigo, arroz e centeio.
- c) Somente trigo, cevada e aveia.
- d) Trigo, cevada, centeio e aveia.
- e) Somente trigo, centeio e aveia.

23. O programa dietético é a base para o tratamento da diabetes melitus e a monitorização envolve uma abordagem multiprofissional.

Indique se é falsa (F) ou verdadeira (V) cada uma das afirmativas.

- () O valor calórico da dieta de pacientes diabéticos deve atender às necessidades orgânicas, de forma que o paciente fique dentro da margem de peso ideal (peso teórico $\pm 10\%$).
- () A quantidade dos carboidratos deve ser observada na elaboração da dieta, pois os polissacarídeos exigem um menor tempo para digestão e absorção.
- () A fonte alimentar dos lipídios deve ser predominantemente de origem vegetal, para prevenir ou atenuar os processos de aterosclerose.
- () As necessidades protéicas, são as mesmas de um indivíduo normal, podendo variar de 0,9 a 2,9 g/kg/dia de peso ideal.

A sequência correta é

- a) V - F - V - F.
- b) F - V - V - F.
- c) V - V - F - F.
- d) F - F - V - V.
- e) V - F - F - V.

24. Os lipídios usados na dieta oral para pacientes com pancreatite crônica são aqueles que podem ser hidrolisados no estômago e no intestino delgado sem a presença da lipase pancreática.

Os _____ podem fornecer calorias na forma de gordura, sem agravar as manifestações e mantendo o peso do paciente.

- a) triglicerídeos de cadeia curta
- b) triglicerídeos de cadeia média
- c) triglicerídeos de cadeia longa
- d) triglicerídeos de origem vegetal
- e) triglicerídeos de origem animal

25. O tratamento de diabetes gestacional inclui

- a) dieta adequada, exercício físico e insulinoaterapia.
- b) dieta adequada, exercício físico e insulinoaterapia (se necessário).
- c) exercício físico e insulinoaterapia, apenas.
- d) dieta adequada e insulinoaterapia, apenas.
- e) apenas hipoglicemiantes.

26. No tratamento dietoterápico de pacientes com hepatite, deve-se oferecer uma dieta:

- a) Hipo a normocalórica; normo a hiperprotéica, com proteínas de alto valor biológico, com quantidade aumentada de ácido fólico, vitaminas: B₁₂, B₆, B₁ e B₂ e C com quantidade aumentada de ferro, zinco e magnésio; com aporte elevado de frutose.
- b) Normo a hipercalórica, hipoprotéica hipolipídica; aumentada em ácido fólico, vitaminas B₁₂, B₆, B₁ e B₂ e C, com quantidade aumentada em ferro, zinco e magnésio, com aporte elevado de frutose.
- c) Normo a hipercalórica; normo a hiperprotéica normolipídica; aumentada em ácido fólico, vitaminas: B₁₂, B₆, B₁ e B₂ e C; com quantidade aumentada em ferro, zinco e magnésio, com aporte elevado de frutose.
- d) Hipocalórica; hipoprotéica hipolipídica; com quantidade aumentada de ácido fólico e vitaminas B₁₂, B₆, B₁ e B₂ e C; com quantidade aumentada em ferro, zinco e magnésio; com elevado aporte de frutose.
- e) Hipercalórica, hiperprotéica, hipolipídica, com quantidade aumentada de ácido fólico e vitaminas B₁₂, B₆, B₁ e B₂ e C; com quantidade aumentada de ferro, zinco e magnésio, com aporte elevado de frutose.

27. Para prevenção de anemia na gestação, é preciso monitorar o consumo de

- a) vitamina A e C.
- b) ferro e ácido fólico.
- c) ferro e iodo.
- d) ácido fólico e magnésio.
- e) ácido fólico e vitamina K.

28. Para uma mulher de 25 anos de idade, as DRIs (Dietary Reference Intakes) recomenda a ingestão de _____ mg de cálcio ao dia.

Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna.

- a) 800
- b) 900
- c) 1.000
- d) 1.200
- e) 1.300

29. Em relação ao aleitamento materno, a Organização Mundial da Saúde recomenda:

- a) Aleitamento exclusivo até os primeiros seis meses de vida e, a partir daí, a introdução de alimentos complementares, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais.
- b) A partir dos seis meses, oferecer, de forma gradual e lenta, outros alimentos e suspender o leite materno.
- c) Aleitamento materno exclusivo até os primeiros quatro meses de vida e, a partir daí, a introdução de alimentos complementares.
- d) Aleitamento materno até os seis primeiros meses de vida com complementação de hidratação com chás e água.
- e) Aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida e complementação com leite de vaca ou de soja.

30. O cuidado nutricional na úlcera gástrica tem como objetivo a redução e neutralização da secreção ácida no estômago. Portanto, deve-se evitar o consumo de

- a) álcool, pimenta, alimentos flatulentos e café.
- b) álcool, pimenta, alimentos ricos em vitamina A.
- c) álcool, café e vegetais verde-escuros.
- d) álcool, pimenta, café e peixe.
- e) pimenta, café, alimentos flatulentos e hortaliças.

31. Considere as seguintes afirmativas:

- I. O ministério da Saúde recomenda a pirâmide alimentar brasileira como guia para escolha de alimentos.
- II. Os grupos alimentares da pirâmide alimentar brasileira têm a mesma divisão em todas as pirâmides, independente do grupo etário. O que varia é o número de porções e, conseqüentemente, as necessidades energéticas e nutricionais para cada idade.
- III. A posição dos alimentos da pirâmide alimentar brasileira não se dá pela importância e sim pela necessidade e quantidade de cada grupo etário.
- IV. As leguminosas se encontram na base da pirâmide brasileira de alimentos.

Estão corretas

- a) apenas I e IV.
- b) apenas II e III.
- c) apenas III e IV.
- d) apenas II, III e IV.
- e) apenas I, II e III.

32. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A avaliação subjetiva global do estado nutricional é um método simples, de baixo custo, que pode ser realizado em poucos minutos e é utilizada não apenas para pacientes cirúrgicos, mas, também, adaptado para outras situações clínicas.
- b) A avaliação subjetiva global do estado nutricional consta de questões simples, porém relevantes, sobre a história clínica, exame físico e exame bioquímico.
- c) A avaliação subjetiva global do estado nutricional torna-se útil não só para o uso hospitalar, mas, também, para monitorar pacientes domiciliares.
- d) A precisão diagnóstica da avaliação subjetiva global do estado nutricional, depende da experiência observada.
- e) Os elementos importantes da história clínica que devem ser avaliados são: alteração de peso nos últimos 6 meses antes da avaliação e alterações nas duas últimas semanas; ingestão alimentar em relação ao padrão usual do paciente; presença de sintomas gastrointestinais significativos, avaliação da capacidade funcional do paciente, demanda metabólica de acordo com diagnóstico.

33. O peso e altura são medidas simples e úteis para a avaliação do estado nutricional de indivíduos. Considere as seguintes afirmativas.

- I. A altura deve ser medida sem sapatos e os pés devem estar juntos com os calcanhares contra a parede ou tábua de medida.
- II. Na medição da altura, o indivíduo deve estar encurvado, olhando para frente, sem inclinar a cabeça para cima ou para baixo. A parte superior da orelha e o canto dos olhos devem estar no plano Frankfurt.
- III. O indivíduo deve ser pesado com o mínimo de roupas e descalço.
- IV. Caso o paciente esteja acamado e não exista registro de peso e altura, é possível estimá-los por meio da altura do joelho.

Estão corretas

- a) apenas I e III.
- b) apenas I e IV.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I, III e IV.
- e) apenas II e IV.

34. Na interação fármaco-nutriente, é correto afirmar que

- a) antivitaminas não inibem a síntese de enzimas específicas.
- b) a isoniasida forma complexo com nutrientes no paciente com tuberculose, aumentando a absorção de vitamina C.
- c) a fenitoina, droga anticonvulsionante (ACPs), causa deficiência de vitamina A, E e K.
- d) os betabloqueadores podem prejudicar a absorção de vitamina B₁₂.
- e) o uso contínuo de glicocorticóides diminui a absorção e aumenta a excreção de cálcio.

35. Paciente de 54 anos, 172 cm de altura, 83 kg, sofreu queimaduras em 20% da área corporal. De acordo com Harris Benedict, assinale a alternativa que apresenta as necessidades energéticas, segundo a fórmula dada

$$\text{GEB} = 66 + (13,7 + P) + (5 \times A) - (6,8 \times I)$$

Fator atividade = 1,2
Fator injúria = 1,0

- a) 3.502,3 kcal
- b) 3.699,5 kcal
- c) 3.489,6 kcal
- d) 3.299,5 kcal
- e) 3.499,6 kcal

36. Na dietoterapia do câncer é indicada a suplementação tanto por via oral, quando por via enteral e parenteral, de vitaminas

- a) do complexo B, vitaminas A, C e K.
- b) do complexo B, vitaminas A e C.
- c) do complexo B, vitaminas A e K.
- d) A, C e K.
- e) A, C e D.

37. No paciente com doença hepática em estágio final, aguardando transplante de fígado, é INCORRETA a seguinte terapia nutricional:

- a) Ofertar 100% do GEB e diminuir oferta energética se houver má absorção na caquexia.
- b) Na encefalopatia, ofertar 0,5 a 0,7 g/kg/dia de proteína suplementar com AACR e restringir as AAA e metionina.
- c) Restringir sódio com cautela se houver ascite e edema.
- d) Suplementar zinco, se houver suspeita de deficiência de calorias adequadas para prevenir catabolismo na encefalopatia.
- e) Quando apresentar hiponatremia restringir líquidos (0,5 a 1,5 litro/dia).

38. São atividades privativas do nutricionista

- I. Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição.
- II. Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos.
- III. Assistência, educação nutricional para coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos, somente em instituições públicas e em consultório de nutrição e dietética.
- IV. Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.

estão corretas

apenas I e II.

apenas I e III.

apenas II e III.

apenas III e IV.

apenas I, II e IV.

39. De acordo com a resolução do CFN nº 304/2003 compete ao Nutricionista:

- I. A prescrição dietética, como parte da assistência hospitalar, ambulatorial, em consultório de nutrição e dietética e em domicílio.
- II. Elaborar o diagnóstico nutricional com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos.
- III. O registro da evolução nutricional no prontuário do cliente/paciente, de acordo com os protocolos preestabelecidos, devendo conter alteração da ingestão alimentar, avaliação de tolerância digestiva, exame físico, antropometria, capacidade funcional e avaliação bioquímica.
- IV. O registro da prescrição dietética no prontuário do cliente/paciente, de acordo com os protocolos preestabelecidos ou aceitos pelas unidades ou serviços de atenção nutricional, devendo conter data, valor energético total (VET), consistência, macro e micronutrientes mais importantes para o caso clínico, fracionamento, assinatura seguida de carimbo com número da identidade e CPF.

Estão corretas

a) apenas I e II.

b) apenas II e III.

c) apenas I, II e III.

d) apenas III e IV.

e) apenas II e IV.

40. O nutricionista, ao solicitar exames laboratoriais, deve avaliar adequadamente os critérios técnicos e científicos de sua conduta, estando ciente de sua responsabilidade frente aos questionamentos técnico decorrentes. No contexto da responsabilidade, o nutricionista deverá:

- I. Considerar o cliente/paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas, individuais, socioeconômicas e religiosas, não havendo necessidade de desenvolver assistência integrada junto à equipe multiprofissional.
- II. Considerar diagnósticos, laudos, pareceres dos demais membros da equipe multiprofissional, definindo com estes, sempre que pertinente, outros exames laboratoriais.
- III. Atuar, considerando o cliente/paciente globalmente, desenvolvendo a assistência integrada à equipe multidisciplinar.
- IV. Respeitar os princípios da bioética.
- V. Solicitar exames laboratoriais cujos métodos e técnicas tenham sido aprovados cientificamente.

Estão corretas

a) apenas I e III.


b) apenas I e IV.

c) apenas I e V.

d) apenas II, IV e V.

e) apenas II, III, IV e V.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CONCURSO PÚBLICO 2003 – HUSM
26/10/2003



CONCURSO PÚBLICO 2003
Agora você pode estar aqui, também!

Nutricionista			
01	A	21	E
02	C	22	D
03	C	23	A
04	D	24	B
05	E	25	B
06	D	26	C
07	C	27	B
08	D	28	C
09	<i>Anulada</i> (A)	29	A
10	B	30	A
11	E	31	E
12	C	32	B
13	D	33	D
14	D	34	E
15	B	35	Anulada
16	C	36	B
17	A	37	A
18	B	38	E
19	E	39	C
20	B	40	E

Welder

Visto:

[Signature]
Dario Trevisan de Almeida,
Presidente da COPERVES.

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAD **COPERVES**