

FOLHETO
COLETÂNEA
6800

FOLHETO COLETÂNEA 6800

CONCURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estar aqui, também!

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

UFSM
Biblioteca Central

Nº INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

NOME DO CANDIDATO

--

CARGO

PSICÓLOGO

--

E08943

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPERVES**
UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Psicólogo

01. Em uma situação de doença e internação, um paciente começa a demonstrar muita raiva de um familiar ou de membros da equipe médica sem que nada de real justifique seus sentimentos. Considerando o referencial psicanalítico, pode-se afirmar que, nessa situação, observa-se

- I. uma atitude, por parte do paciente, de total indiferença em relação a sua patologia.
- II. uma inadequação do comportamento do paciente, considerando que não há elementos reais que justifiquem tais atitudes.
- ☒ III. o uso de mecanismo defensivo de deslocamento, pois, para aplacar a raiva e a angústia, o paciente coloca em outras pessoas o que não consegue administrar dentro de si.
- IV. uma situação onde se atualizam os conflitos que o paciente, por ventura, tivesse anteriormente com essas pessoas.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- ☒ c) apenas III.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

02. Considerando alguns dos sinais e/ou sintomas que se desenvolvem durante, ou logo após o uso de substâncias, e seu respectivo tipo de intoxicação, correlacione as colunas.

- 1- Conjuntivas injetadas, apetite aumentado, boca seca e taquicardia.
- 2- Taquicardia ou bradicardia, dilatação das pupilas, pressão sanguínea elevada ou baixa, perspiração ou calafrios, náusea ou vômitos, evidência de perda de peso, agitação ou retardo psicomotor, fraqueza muscular, depressão respiratória, dor torácica ou arritmias cardíacas, confusão, convulsões, discinesias e distonias ou coma.
- 3- Fala arrastada, falta de coordenação, marcha instável, nistagmo, comprometimento na atenção ou memória e estupor ou coma.
- 4- Taquicardia ou bradicardia, dilatação das pupilas, pressão sanguínea elevada ou baixa, perspiração ou calafrios, náusea ou vômitos, evidência de perda de peso, agitação ou retardo psicomotor, fraqueza muscular, convulsões, discinesias e distonias ou coma.
- 5- Tontura, nistagmo, fraca coordenação, fala arrastada, marcha instável, letargia, reflexos deprimidos, retardo psicomotor, tremor, fraqueza muscular generalizada, visão turva ou diplopia, estupor ou coma e euforia.

- () Intoxicação com Anfetaminas
- () Intoxicação com Inalante
- ☒ 2 Intoxicação com Cocaína
- ☒ 1 Intoxicação com Cannabis
- ☒ 3 Intoxicação com Álcool

A sequência correta é

- a) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- b) 2 - 3 - 1 - 5 - 4.
- ☒ c) 4 - 5 - 2 - 1 - 3.
- d) 5 - 2 - 4 - 3 - 1.
- e) 3 - 1 - 5 - 2 - 4.

03. Considerando o nível de adesão a um tratamento proposto, assinale a alternativa correta.

- a) Será maior se o paciente tiver outras preocupações para dar prioridade.
- ☒ b) Será maior se o paciente for atendido por um profissional que simplificar o esquema de tratamento, dividindo-o em passos.
- c) Será maior se o paciente for acometido de uma patologia assintomática.
- d) Será maior se o paciente julgar-se incapaz de seguir o tratamento.
- e) Será maior se o paciente tiver informações imprecisas sobre o que deve fazer.

04. Considere as seguintes afirmações sobre instrumentos de avaliação psicológica, assinalando com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

(V) O Teste Gestáltico Visomotor – Bender é indicado para triagem de disfunção cerebral, para avaliar déficit cognitivo em pacientes dependentes do álcool e para avaliar a presença e severidade de aspectos psicopatológicos, entre outros.

(V) O Inventário de Depressão de Beck (BDI) é indicado para avaliar, em adolescentes e adultos, pessimismo e expectativas negativas frente ao futuro.

(F) O Inventário de Personalidade Multifásico Minnesota (MMPI) é indicado para avaliar forças e fraquezas no funcionamento cognitivo, especialmente funções mnêmicas e de flexibilidade na resolução de problemas.

(F) O Teste de Rorschach é indicado para detectar a dinâmica interpessoal, diagnóstico de personalidade e planejamento terapêutico.

(V) O Inventário de Ansiedade Traço Estado – IDATE é indicado para avaliar ansiedade como estado e como traço.

A sequência correta é

a) F - F - F - V - V.

b) F - F - V - V - F.

c) V - F - F - V - V.

d) V - V - F - F - V.

e) V - V - V - F - F.

05. Em relação ao termo "hospitalismo", pode-se afirmar que

a) tornou-se mais conhecido após os estudos de Spitz, referindo-se aos quadros de apatia e depressão e relaciona-se ao desejo consciente ou inconsciente do paciente de ser cuidado pela instituição.

b) é uma expressão utilizada por Melanie Klein para descrever o mecanismo presente na posição depressiva.

c) se refere ao comportamento evidenciado pelo paciente hospitalizado em relação ao apego excessivo à equipe médica, descrito por Bion.

d) é uma fase do processo de negação da doença, descrito por Freud.

e) indica uma situação onde o paciente deprime-se por ter de voltar ao hospital, logo após um período de internação longa.

06. Considerando o trabalho de uma equipe na Unidade de Tratamento Intensivo, é INCORRETO afirmar que

a) o início de confusão mental, em um paciente de UTI, geralmente significa uma mudança importante em sua condição clínica.

b) a UTI é um ambiente gerador de estresse para médicos e suas equipes.

c) situações que exigem a realização de procedimentos complexos ou invasivos produzem situações de estresse nos médicos.

d) a supervisão individual, o treinamento e o remanejamento das tarefas contribuem para o aumento de conflitos nas equipes de UTI.

e) isolamento ou ligação excessiva com a equipe, respostas dadas aos pacientes de forma mecânica, fadiga e exaustão crônicas são indicadores da síndrome de esgotamento para quem trabalha em UTI.

07. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa INCORRETA.

a) O julgamento envolve a capacidade de o paciente fazer julgamentos sociais, agindo baseado na avaliação do resultado provável do seu comportamento. O paciente, com grau significativo de prejuízo no julgamento, pode estar em risco, acentuadamente alto, de ferir a si mesmo e aos outros.

b) O afeto é definido como a expressão externa da resposta emocional do paciente. Ele pode ser congruente ou incongruente com o humor.

c) A atenção pode ser definida como o estado de concentração da atividade mental sobre determinado objeto. A hiperprosexia refere-se a uma alteração da atenção, na qual observa-se um estado de atenção exacerbado e obstinado sobre certos objetos.

d) Na avaliação do pensamento, enquanto processo de pensar, considera-se o curso, a forma e o conteúdo. O conteúdo pode ser definido como os temas predominantes, o assunto em si.

e) A linguagem é descrita em termos de velocidade, volume, ritmo e quantidade. A alteração da linguagem, descrita como afasia, diz respeito à incapacidade de articular corretamente as palavras devido a alterações neuronais referentes ao aparelho fonador, portanto, ocorre uma incapacidade motora no órgão fonador.

08. Em 1920 Freud anuncia sua segunda teoria das pulsões, propondo um novo dualismo pulsional. Considerando esse contexto teórico, pode-se afirmar que

- a) a primeira teoria das pulsões propunha um dualismo pulsional entre pulsões de vida e pulsões sexuais.
- ☒ b) os estudos de Freud sobre compulsão à repetição constataam uma força (além do princípio de prazer), contribuindo para a elaboração dessa nova teoria pulsional.
- c) a noção de compulsão à repetição foi abandonada junto com a primeira teoria das pulsões.
- d) o conceito de histeria de conversão foi fundamental para a formulação deste novo dualismo.
- e) o conceito de pulsão de morte relaciona-se às pulsões de autoconservação ou do ego, da primeira teoria das pulsões.

09. De acordo com as classificações atuais dos Transtornos Mentais, a característica essencial do Transtorno Conversivo é a

- ☒ a) presença de sintomas ou déficit, afetando a função motora ou sensorial, associada a fatores psicológicos, mas que sugerem etiologia neurológica.
- b) falsa crença de estar grávida, associada com sinais objetivos de gravidez, que podem incluir aumento abdominal, redução do fluxo menstrual, sensação subjetiva de movimento fetal.
- c) produção ou simulação intencional de sinais ou sintomas físicos, a fim de assumir, indiretamente, o papel de enfermo e alcançar a atenção desejada.
- d) perturbação episódica de estreitamento da consciência, com comportamentos e movimentos estereotipados, vivenciados como estando além do controle do indivíduo.
- e) perda de consciência, concomitantemente assumindo uma identidade onde um espírito externo ou entidade entra no corpo do indivíduo e assume o controle do comportamento.

10. Considerando-se a definição de Bioética, pode-se afirmar:

- I. É a parte teórica da ética que se destina à definição de regras para publicação de pesquisas com embriões.
- ☒ II. É a ética aplicada que se ocupa do uso correto das novas tecnologias, na área das ciências médicas e da solução adequada dos dilemas morais, por elas apresentados.
- III. É a ética aplicada que se ocupa das relações internacionais entre países do primeiro mundo no que diz respeito à troca de informações sobre pesquisas que envolvem seres humanos.
- IV. É a especialidade da medicina que se ocupa de estudos teóricos sobre o desenvolvimento da genética molecular e da geneterapia.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- ☒ b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas IV.
- e) I, II, III e IV.

11. Escreve Freud em 1938, "o paciente produz diante de nós, com clareza plástica, uma parte importante da história de sua vida, da qual, de outra maneira, ter-nos-ia, provavelmente, fornecido apenas um relato insuficiente. Ele a representa diante de nós, por assim dizer, em vez de apenas nos contar". Freud refere-se ao fenômeno

- a) da renegação ou desmentida.
- b) do recalcamto originário.
- c) da forclusão.
- ☒ d) da transferência.
- e) da reação terapêutica negativa.

12. O código de Ética Profissional do Psicólogo, na Resolução CFP Nº 002-87, menciona que o agir ético vai além do pensar bem e honestamente, exigindo, ao mesmo tempo, que a consciência, que é "uma síntese ativa em perpétua realização" se manifeste de modo explícito, através de ações claras e visíveis. Assim, é VEDADO ao psicólogo

- a) assumir responsabilidade somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal e tecnicamente.
- ☒ b) desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo.
- c) participar de movimentos de interesse da categoria que visem à promoção da profissão, bem como daqueles que lhe permitem promover o bem-estar do cidadão.
- d) em seus atendimentos, garantir condições ambientais adequadas da(s) pessoa(s) atendida(s), bem como a privacidade que garante o sigilo profissional.
- e) repassar todo material do local de trabalho ao psicólogo que vier a substituí-lo, em caso de sua demissão ou exoneração.

13. Considerando a definição de interconsultoria em uma instituição hospitalar, pode-se afirmar que esta

- ☒ I- corresponde a uma situação, onde os profissionais de saúde ficam impedidos de compartilhar informações sobre o paciente atendido pela equipe.
- II- caracteriza uma situação onde um profissional atende ao paciente e seus familiares.
- ☒ III- tem como objetivo promover avaliações e discussões em grupo, com a equipe que cuida do paciente.
- IV- diz respeito, unicamente, à situação de supervisão entre um profissional e um estagiário/residente.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- ☒ c) apenas III.
- d) apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.

14. Considerando que as manifestações de dor implicam grande demanda de atendimento tanto médico, como psicológico, pode-se afirmar:

- I. Dor crônica pode ser definida como uma dor recente, de curta duração com resposta ansiosa.
- II. Dor aguda pode ser definida como um processo de longa duração (mínimo três meses), com ativação de memória da dor.
- III. Toda dor tem um componente psicogênico e todo grau de dor relaciona-se, para além do grau de lesão existente, à representação psicológica, familiar, cultural daquele indivíduo que sofre.
- IV. Dor é uma experiência sensorial e emotiva desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial ou descrita em termos de dano.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas II e IV.
- ☒ e) apenas III e IV.

15. Para uma eficaz e qualificada inserção da Psicologia nas instituições médicas e hospitalares, é importante que o psicólogo considere em suas intervenções

- a) a prioridade do modelo psicológico sobre as demais estratégias de intervenção junto aos pacientes e à equipe.
- ☒ b) a etiologia específica das doenças, relacionando-as, sempre, aos aspectos emocionais.
- c) a importância de, inicialmente, o paciente passar por uma avaliação psicológica para, posteriormente, ser encaminhado para uma avaliação orgânica.
- d) a importância de ter uma visão integradora do processo de adoecer, com base em um modelo teórico-explicativo a respeito da interação entre os fenômenos biológicos, psicológicos e sociais.
- e) o modelo tradicional de diagnóstico e psicoterapia visando, em primeiro lugar, a uma ação mais curativa do que preventiva.

16. Considerando a situação de proximidade de morte de um paciente terminal, assinale a alternativa correta.

- ☒ a) O psicólogo deverá considerar que o que está em jogo não é apenas contar ou não a verdade e, sim, atentar para a forma de como fazê-lo, priorizando um espaço de continência à tristeza ou ao medo da situação vivida, acompanhando o paciente e sua família nas necessidades emergentes.
- b) O psicólogo deve utilizar a forma "padrão" de procedimentos, indicando ao paciente e seus familiares o modo correto de enfrentar a situação.
- c) O psicólogo deverá auxiliar a família a não falar ao paciente, em hipótese alguma, sobre sua verdadeira situação.
- d) O psicólogo deverá ter, como único objetivo de sua intervenção, o prolongamento da vida do paciente.
- e) O conteúdo da entrevista com o paciente será sempre determinado pelo psicólogo e o tema da morte deverá ser obrigatoriamente abordado.

17. De acordo com as classificações atuais dos Transtornos Mentais, a característica essencial do Transtorno de Hipocondria é a preocupação

- ☒ a) com a possibilidade de vir a ter ou a idéia de já ter uma doença grave, com base na interpretação errônea dos próprios sintomas somáticos.
- b) excessiva (apreensiva) com diversos eventos ou atividades, acompanhada de sensação de estar com os nervos à flor da pele, irritabilidade, fadigabilidade e perturbação do sono.
- c) persistente e quase delirante com algum defeito imaginário na aparência, acompanhada de sinais ou sintomas físicos e psicológicos combinados.
- d) intensa e persistente com sintomas físicos que se manifestam na maioria dos dias por, pelo menos, 6 meses.
- ☒ e) excessiva com a ingestão de medicamentos que auxiliem a diminuir ou aliviar sintomas dolorosos e gastrointestinais.

18. O paciente internado na UTI, além de apresentar um quadro clínico grave, poderá desenvolver algumas patologias psicológicas em decorrência de sua condição atual. Pode-se afirmar que é(são) comum(ns)

- I. Parafilias.
- II. Depressão.
- III. Ansiedade.
- IV. Delirium.
- V. Anorexia.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas III.
- ☒ d) apenas II, III e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

19. Considere as proposições sobre normalidade psíquica associada à doença orgânica.

- I. Domínio de faculdades previamente adquiridas, sem retrocessos importantes.
- II. Devotamento e/ou envolvimento rápido com atividades prazerosas, mas com alto potencial para consequências dolorosas.
- III. Ausência total de psicopatologia grave e de sérias anomalias psicológicas.
- IV. Aptidão para experimentar reações afetivas com flexibilidade para elaborar inevitáveis conflitos e chegar até soluções aceitáveis.
- V. Sentir-se parte de uma configuração social e estar consciente de suas normas e valores.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas III e IV.
- d) apenas II, III e V.
- e) apenas I, III, IV e V.

20. Em relação aos Transtornos Factícios, é correto afirmar que

- a) os sintomas físicos ou psicológicos são intencionalmente produzidos ou simulados, com o fim de obter um incentivo externo.
- b) os sintomas físicos ou psicológicos não são produzidos intencionalmente, iniciando antes dos 30 anos e provocando a busca de vários tratamentos médicos.
- c) os sintomas físicos ou psicológicos provocam confusão acerca da identidade pessoal ou adoção de uma nova identidade.
- d) os sintomas físicos ou psicológicos são intencionalmente produzidos ou simulados, com o fim de assumir o papel de doente.
- e) os sintomas físicos ou psicológicos provocam intenso desconforto e se desenvolvem abruptamente, alcançando o pico máximo de intensidade em 10 minutos.

21. Considere as seguintes afirmações sobre *delirium*, assinalando com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

- (F) A idade avançada não é um importante fator de risco para o desenvolvimento de *delirium*.
- (V) A maioria das causas de *delirium* situa-se dentro do sistema nervoso central.
- (V) É um comprometimento da consciência, geralmente visto em associação com comprometimentos globais das funções cognitivas.
- (F) Classicamente, o *delirium* tem um início lento (de semanas ou meses), um curso longo e estável e uma melhora demorada, mesmo quando o fator causal é identificado.
- (V) Reação desnortada, intranquila, confusa, desorientada, associada com medo e alucinações.

A sequência correta é

- a) F - V - V - F - F.
- b) V - F - F - V - F.
- c) V - F - V - F - V.
- d) F - F - V - F - V.
- e) F - V - F - V - V.

22. Considere as seguintes afirmações sobre as pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

- I. Pacientes com infecção por HIV podem ter quaisquer dos transtornos de ansiedade, mas são, particularmente comuns, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo.
- II. Resultado positivo no teste sorológico para o HIV indica que a pessoa está infectada, mas que não é capaz de propagar a doença, portanto, não é fundamental a indicação de acompanhamento psicoterápico individual nem grupal.
- III. Fatores de risco para o suicídio, em pacientes infectados com HIV, são: ter amigos que morreram de AIDS, recaídas, difíceis questões sociais relacionadas à homossexualidade, apoio social e financeiro inadequados e presença de demência ou *delirium*.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) I, II e III.

23. Considerando que, no contexto hospitalar, a entrevista também é instrumento fundamental de trabalho do psicólogo, avalie as afirmações, assinalando a INCORRETA.

- a) A entrevista não é uma técnica única. Existem várias formas de efetivá-la, conforme o objetivo específico da entrevista e a orientação do entrevistador.
- b) O resultado de uma entrevista depende, largamente, da experiência e da habilidade do entrevistador, além do domínio da técnica.
- ☒ c) A entrevista clínica de livre estruturação é assim denominada, por que o entrevistador tem clareza de seus objetivos, de que tipo de informação é necessário para atingi-los, de como essa informação deve ser obtida, quando ou em que sequência, em que condições deve ser investigada e como deve ser considerada.
- d) A entrevista de triagem tem por objetivo principal avaliar a demanda do sujeito e fazer um encaminhamento.
- e) Para levar uma entrevista a termo, de modo adequado, o psicólogo deve ser capaz de estar presente, inteiramente disponível para o outro naquele momento, e poder ouvi-lo sem a interferência de questões pessoais.

24. Tomando como referência o Código de Ética Profissional do Psicólogo, considere as afirmações, com relação ao sigilo profissional. Assinale com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

- ☒ (V) O sigilo protegerá o atendido em tudo aquilo que o Psicólogo ouve, vê ou de que tem conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional.
- ☐ (F) O psicólogo poderá remeter, quando julgar conveniente, informações confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por Código de Ética.
- ☒ (V) O sigilo profissional protegerá o menor impúbere ou interdito, devendo ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para promover medidas em seu benefício.
- ☐ (F) É permitido aos Psicólogos utilizar meios eletrônicos de registro audiovisual mesmo que o paciente não esteja informado da utilização desses recursos.
- ☒ (V) A quebra do sigilo só será admissível, quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para o próprio atendido ou para terceiros puder criar, para o Psicólogo, o imperativo de consciência de denunciar o fato.

A sequência correta é

- a) V - V - V - F - F.
- ☒ b) V - F - V - F - V.
- c) V - V - F - V - F.
- d) F - F - V - F - V.
- e) F - F - F - V - V.

25. O Psicólogo ligado à equipe de transplante p acompanhar o paciente e seus familiares antes e após procedimento, com atuações específicas em cada fase. Considere as seguintes afirmações sobre esse tema.

- ☒ I. Certos pacientes demonstram sentimentos de angústia de culpa quando sabem que o doador era criança adolescente. Nesses casos, o psicólogo deve lembrá-los de que a morte não seria evitada caso seus órgãos fossem doados.
- ☒ II. O período de espera entre a seleção para o transplante, propriamente dito, é muito estressante, sendo raro o surgimento de sintomas de ansiedade e depressão. Paciente e familiares têm que encarar o desafio de estarem preparados tanto para a morte como para a vida.
- ☒ III. Oferecer ao candidato a transplante e aos seus familiares o mínimo de informações sobre o procedimento de transplante é um dos pilares da assistência exitosa na fase pré-operatória.
- ☒ IV. Alguns pacientes acreditam que o órgão transplantado é capaz de influenciá-los psicologicamente, como se traços psicológicos do doador também fossem transplantados ao receptor.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II.
- d) apenas III e IV.
- ☒ e) apenas I, II e IV.

26. Pessoas que tentam ou cometem suicídio são pessoas vivendo sob tensão e que expressam de modo agudo seu sofrimento. Psicólogos e outros profissionais da área de saúde mental devem se desfazer de idéias equivocadas em relação ao suicídio. Considere as seguintes afirmações sobre o tema.

- ☒ I. Presença de Transtornos Mentais aumenta o risco de suicídio.
- ☒ II. Questionamentos sobre suicídio, podem induzir o paciente a cometê-lo.
- ☒ III. Doenças orgânicas incapacitantes e lesões desfigurantes relacionam-se a uma maior taxa de suicídio.
- ☒ IV. Ameaça de suicídio é apenas manipulação.

Está(ão) equivocada(s)

- ☒ a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- ☒ c) apenas II e IV.
- d) apenas II, III e IV.
- ☒ e) apenas III e IV.

27. A psicoterapia de Apoio (PA) é um modelo eclético de psicoterapia, largamente utilizado em instituições. Sobre essa modalidade de tratamento é correto afirmar que

- a) o foco das intervenções do terapeuta é trazer, à consciência do paciente, impulsos e desejos rechaçados e reprimidos, para fortalecer o ego.
- b) a PA objetiva a correção de problemas psicopatológicos ou déficit adquiridos em etapas anteriores.
- c) o foco de intervenção é no aqui e agora, estimulando-se os relatos de eventos recentes mais significativos.
- d) o objetivo é orientar o paciente a expressar-se livremente e sem censura quanto a sentimentos, pensamentos, fantasias e sonhos, sem prejuízo sobre sua relevância ou significado.
- e) o foco das intervenções é não facilitar que o paciente veja o terapeuta como um "espelho" de si mesmo nem encorajá-lo a se identificar com o terapeuta.

28. Correlacione as colunas:

- 1- Local destinado ao atendimento de pacientes, primordialmente para diagnóstico e tratamento, através de execução de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dirigidas ao indivíduo, à família e ao meio, quando constatada a não-necessidade de internação.
- 2- Local destinado ao atendimento diagnóstico de tratamento de pacientes acidentados ou acometidos de mal súbito, com ou sem risco iminente de vida.
- 3- Local destinado a receber pacientes que necessitam de assistência médica e de enfermagem por 24 horas, em regime de internação.
- 4- Local destinado a receber pacientes em estado grave, com possibilidades de recuperação, exigindo permanentemente assistência médica e de enfermagem (diuturnas), além da utilização eventual de equipamento especializado.
- 5- Lugar onde se expõem ou guardam os cadáveres que vão ser autopsiados (necropsias) ou identificados por familiares ou conhecidos.

- (5) Necrotério
- (3) Enfermaria
- (1) Ambulatório
- (4) Unidade de Terapia Intensiva
- (2) Pronto Socorro

A seqüência correta é

- a) 5 - 2 - 3 - 4 - 1.
- b) 1 - 4 - 2 - 3 - 5.
- c) 4 - 5 - 2 - 1 - 3.
- d) 5 - 3 - 1 - 4 - 2.
- e) 2 - 3 - 4 - 1 - 5.

29. Ideação, gestos e tentativa de suicídio são fenômenos cada vez mais crescentes na área da Saúde Mental. Vários aspectos devem ser considerados para detectar a possibilidade de riscos de suicídio. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações a seguir.

- (V) Sempre que se deparar com um paciente deprimido, cronicamente ansioso e hostil, desmoralizado e sem perspectivas, deve-se investigar detidamente o risco de suicídio.
- (F) Altos níveis de esperança e altas habilidades de resolução de problemas são fatores de risco para o suicídio.
- (F) Jovens sem Transtorno de Humor que se mostram violentos, agressivos e impulsivos podem estar propensos ao suicídio durante conflitos com a família ou com seus pares.
- (F) Traços autodestrutivos e impulsivos, emprego estável, separações recentes e gênero masculino são fatores minimizadores do suicídio.
- (V) Fatores predisponentes ao suicídio incluem perda de status frente a seus pares, término de um romance, dificuldades escolares, desemprego, luto, separação e rejeição.

A seqüência correta é

- a) V - F - V - F - V.
- b) V - F - F - F - F.
- c) F - V - F - V - V.
- d) F - F - V - F - V.
- e) F - V - F - V - F.

30. Há uma série de fatores terapêuticos na situação de atendimento psicoterápico grupal, que podem ser aproveitados para a resolução dos mais diferentes problemas. Assinale com V as afirmações verdadeiras relacionadas a esses fatores terapêuticos e com F, as afirmações falsas.

- () Estabelecimento de uma hipótese psicodinâmica individual explicativa do problema principal ou do foco, que faz sentido aos pacientes, a qual eles respondem positivamente e que orienta as intervenções do terapeuta.
- (V) A catarse, pela possibilidade de obter alívio pela ventilação de emoções.
- (V) O tratamento de temas ou problemas existenciais auxilia as pessoas a lidar com eles.
- () Dessensibilização sistemática (exposição gradual in vivo, exposição em imaginação etc.) com o objetivo de remover defesas patológicas.
- (V) A percepção de outras pessoas com os mesmos problemas e se sentindo melhor, desperta nos pacientes mais esperança em ultrapassar suas dificuldades.

A sequência correta é

a) V - F - F - V - F.

b) V - V - F - V - F.

☒ c) F - V - V - F - V.

d) F - F - V - V - F.

e) F - F - V - F - V.

31. Avalie as seguintes afirmações sobre a prática do Psicólogo no contexto hospitalar. Assinale com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

- (F) Cabe ao psicólogo aguardar o pedido das equipes na sua sala, submetendo-se às normas e rotinas das unidades.
- (V) A postura do psicólogo no *setting* hospitalar deve ser flexível, utilizando-se dos recursos disponíveis, adaptando-se de forma inteligente e racional, respeitando limites e fazendo valer os seus, dentro de um clima de cordialidade.
- (F) O essencial nas tarefas do psicólogo, desenvolvidas no hospital, é o mesmo daquele que exerce suas atividades em um consultório particular, isto é, avaliar personalidade, modificar comportamentos, buscar as raízes dos problemas nas relações infantis, ter acesso a familiares e a outros profissionais, entre outras.
- (V) Sem preterir de profundidade nem de qualidade, a abordagem do psicólogo, no hospital, deve ser focal, visando a aspectos relacionados com a doença, dificuldades adaptativas à instituição hospitalar, ao processo do adoecer, aos meios diagnósticos.
- (V) Desenvolver a atividade de psicólogo, em um hospital, significa circular pelo hospital, conhecer in loco o trabalho de seus colegas de equipe, compreender as rotinas, os horários, atender ao paciente em seu quarto ou andar.

A sequência correta é

a) V - V - F - F - F.

b) V - F - F - V - V.

c) F - F - V - F - V.

d) F - F - V - V - F.

☒ e) F - V - F - V - V.

32. Considerando uma situação de entrevista inicial, analise as afirmativas:

- ☒ I. Caracteriza uma situação onde o terapeuta deverá exercer, invariavelmente, uma posição interpretativa, uma vez que tal situação de entrevista caracteriza a neurose transferencial descrita por Freud.
- ☐ II. Caracteriza uma situação onde serão discutidos e combinados os aspectos referentes ao contrato psicoterapêutico.
- ☐ III. Caracteriza uma situação onde o terapeuta deverá estar atento aos aspectos motivacionais e à demanda terapêutica do paciente.
- ☒ IV. Caracteriza uma situação na qual, segundo o referencial psicanalítico, o terapeuta somente informará ao paciente dados previamente estabelecidos, como número de sessões e período de duração do tratamento.
- ☐ V. Caracteriza uma situação onde, a partir de um ou mais encontros, terapeuta e paciente estabelecem as combinações necessárias à sequência do tratamento propriamente dito.

Estão corretas

- a) apenas I e III.
- b) apenas I e IV.
- c) apenas I, II e IV.
- ☒ d) apenas II, III e V.
- e) apenas IV e V.

33. As seguintes afirmativas são referentes a uma situação de atendimento psicoterápico de emergência.

- ☒ I. A psicoterapia de emergência é um método de tratamento para sintomas ou desadaptações que exigem alívio o mais rápido possível, devido a sua natureza perigosa ou destrutiva.
- ☐ II. O principal, em um atendimento de emergência, é propiciar as condições necessárias para que o paciente coloque sua problemática.
- ☒ III. Considerando o estado do paciente, o psicólogo deve recusar-se a ouvi-lo para não aumentar seu estado de angústia.
- ☒ IV. O manejo da transferência é uma das questões mais complexas no atendimento às emergências. O terapeuta deve estar atento ao papel da transferência e dominá-la desde o primeiro momento do contato com o paciente.
- ☒ V. As manifestações transferências são repetições exatas do que ocorreu no passado do paciente e, assim, devem ser desconsideradas pelo psicólogo na situação de urgência.

Estão corretas

- a) apenas I, II e V.
- b) apenas II, III e IV.
- c) apenas III e IV.
- d) apenas III e V.
- ☒ e) apenas I, II e IV.

34. Considerando as seguintes patologias - Neurose, Psicose e Perversão - pode-se relacionar, respectivamente, seus principais recursos defensivos:

- a) desmentida, forclusão e recalque.
- ☒ b) recalque, forclusão e negação.
- c) forclusão, intelectualização e negação.
- d) negação, forclusão e recusa.
- e) recalque, fobia e somatização.

35. Em relação à adolescência, é INCORRETO afirmar:

- a) É uma crise vital como o são tantas outras ao longo da evolução do indivíduo.
- ☒ b) É o período do desenvolvimento humano no qual surge a sexualidade.
- c) É um momento evolutivo assinalado por um processo de organização ou estruturação do indivíduo.
- d) É um complexo psicossocial assentado em uma base biológica.
- e) Pode ser caracterizada como uma etapa na qual se busca pautas de identificação no grupo de iguais

36. Assinale a alternativa que apresenta a dinâmica de um processo de luto descrito por Freud.

- ☒ a) Contrapõe-se ao descrito no processo de melancolia. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o ego que se torna pobre e vazio.
- b) Refere-se a um aumento de investimento no mundo externo, com exagerada capacidade de adotar um novo objeto de amor.
- c) Refere-se a uma situação de dor psíquica que somente ocorre perante a morte de uma pessoa importante na vida do sujeito enlutado.
- d) Assemelha-se ao processo descrito na melancolia, uma vez que, em ambos, ocorrem sentimentos intensos de desvalia e expectativa delirante de punição.
- e) Contrapõe-se ao descrito no processo de melancolia. No luto, é o próprio ego que se torna vazio; na melancolia, é o mundo que se torna pobre e vazio.

37. O psicólogo hospitalar, em seu trabalho com o paciente, deverá considerar diferentes tipos de relação.

- I. Paciente consigo mesmo – personalidade, necessidades, mitos e fantasias.
- II. Pessoa com a pessoa (quem é o paciente e quem é o cuidador) sexo, idade, procedência, costumes.
- III. Paciente com o processo de adoecer e com a situação da hospitalização.
- IV. Paciente com grupos – seu grupo familiar, a equipe multiprofissional, o grupo de outros pacientes.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e II.
- b) apenas III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.
- ☒ e) I, II, III e IV.

38. O conceito de narcisismo, na psicanálise, refere-se:

- a) a um momento característico do final da adolescência.
- b) a uma patologia relacionada às fantasias originárias do sistema inconsciente.
- ☒ c) a uma etapa do desenvolvimento libidinal, situada entre o auto-erotismo e as relações de objeto.
- d) ao agente psíquico responsável pelo recalçamento.
- e) à instância psíquica responsável pela auto-observação e consciência moral.

39. Considerando as principais escolas de psicopatologia, pode-se afirmar:

- I. Para a psiquiatria descritiva interessa, fundamentalmente, a forma das alterações psíquicas, a estrutura dos sintomas, aquilo que caracteriza a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico.
- ☒ II. No enfoque comportamental, o homem é visto como ser dominado por forças, desejos e conflitos inconscientes.
- III. Para a psiquiatria dinâmica, interessa a descrição da vivência, a repetição que confirma dados estatísticos da frequência de determinados sintomas, previamente descritos.
- ☒ IV. Na visão psicanalítica, o homem é visto como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, regulados por estímulos específicos e gerais.

Está(ão) correta(s)

- ☒ a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.


40. São níveis essenciais para a atuação do psicólogo hospitalar:

- I. Psicoterapêutico
- ☒ II. Psicoantropológico
- III. Psicoprofilático
- ☒ IV. Psicofarmacológico
- V. Psicopedagógico

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e IV.
- ☒ c) apenas III e IV.
- d) apenas II, III e V.
- ☒ e) apenas I, III e V.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CONCURSO PÚBLICO 2003 – HUSM
26/10/2003



CONCURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estar aqui, também!

Psicólogo			
01	C	21	D
02	C	22	D
03	B	23	C
04	C	24	B
05	A	25	E
06	D	26	C
07	E	27	C
08	B	28	D
09	A	29	A
10	B	30	C
11	D	31	E
12	B	32	D
13	C	33	E
14	E	34	B
15	D	35	B
16	A	36	A
17	A	37	E
18	D	38	C
19	E	39	A
20	D	40	E

Visto:

Dario Trevisan de Almeida,
Presidente da COPERVES.